

藥物濫用
案件暨檢驗統計資料
【一〇六年五月】



衛生福利部彙編

摘要：

一、 台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體

106年5月台灣地區濫用藥物尿液檢驗檢體總件數共計24,921件，檢體陽性數(實數)為7,797件(31.3%)，其中送驗項目包含嗎啡者計19,928件，嗎啡之總陽性數為1,632件(8.2%)；送驗項目包含甲基安非他命者計18,225件，甲基安非他命之總陽性數為5,541件(30.4%)；送驗項目包含愷他命者計6,104件，愷他命陽性數為1,835件(30.1%)；包含MDMA者計17,084件，MDMA總陽性數62件(0.4%)；包含可待因者計19,928件，可待因總陽性數1,235件(6.2%)；另同時檢出嗎啡及可待因陽性數387件，同時檢出嗎啡、可待因及甲基安非他命陽性數781件，同時檢出甲基安非他命及愷他命陽性數246件，同時檢出MDMA及愷他命陽性數28件。106年1-5月檢體總陽性數(實數)較105年1-5月減少9.1%，嗎啡總陽性數較105年1-5月減少12.8%，甲基安非他命總陽性數較105年1-5月增加3.9%，愷他命總陽性數較105年1-5月減少37.0%，MDMA總陽性數較105年1-5月減少4.1%，可待因總陽性數較105年1-5月減少13.2%。(詳表一、圖一)

二、 台灣地區非尿液檢體

- (一) 106年5月台灣地區非尿液檢體共檢出陽性件數12,916件，排名前3位排列順序為：Methamphetamine(甲基安非他命)2,631件(20.4%)、Ketamine(愷他命)1,749件(13.5%)、Heroin(海洛因)1,633件(12.6%)(詳表二之二)；106年1-5月與105年1-5月相比較，檢出陽性總件數增加40.6%，海洛因增加20.8%、甲基安非他命增加27.7%、Ketamine(愷他命)減少18.9%(詳表二)；而106年5月首次檢出之藥物組合共1,874件。(詳表二之一)
- (二) 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)自100年6月首次檢出，於102年3月8日列為第三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；100年檢出21件、101年檢出240件、102年檢出447件、103年檢出430件、104年檢出89件，105年檢出168件，106年1-5月檢出39件。
- (三) bk-MDMA自98年9月首次檢出，於100年9月8日增列為第三級毒品，101年4月6日列為第三級管制藥品；98年檢出1件、99年檢出104件、100年檢出367件、101年檢出684件、102年檢出1,498件、103年檢出12,469件、104年檢出7,747件，105年檢出4,012件，106年1-5月檢出2,105件。
- (四) Chloroamphetamine自98年4月首次檢出，於102年9月18日列為三級毒品，102年10月21日列為第三級管制藥品；98年檢出238件、99年檢出270件、100年檢出265件、101年檢出199件、102年檢出302件、103年檢出796件、104年檢出489件，105年檢出202件，106年1-5月檢出46件。
- (五) Mephedrone自99年1月首次檢出，於99年7月27日列為第三級毒品，99年7月29日列為第三級管制藥品；99年檢出186件、100年檢出48件、101年檢出14件、102年檢出308件、103年檢出10,716件、104年檢出3,008件，105年檢出4,933件，106年1-5月檢出9,546件。

- (六) Methylenedioxypropylamphetamine (MDPV)自100年8月首次檢出，於101年6月29日列為第二級毒品，101年9月27日列為第二級管制藥品；100年檢出4件、101年檢出221件、102年檢出399件、103年檢出1,477件、104年檢出1,436件，105年檢出96件，106年1-5月檢出7件。
- (七) TFMP自97年4月首次檢出，於101年6月29日增列為第三級毒品，101年9月27日列為第三級管制藥品；97年檢出1件、98年檢出1件、99年檢出17件、100年檢出25件、101年檢出66件、102年檢出147件、103年檢出1,495件，104年檢出58件，105年檢出2件，106年1-5月檢出1件。
- (八) XLR-11自102年10月首次檢出，於103年4月16日列為第三級毒品，103年10月6日列為第三級管制藥品；102年檢出4件、103年檢出344件，104年檢出4,281件，105年檢出552件，106年1-5月檢出454件。

三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案

106年5月台灣地區醫療院所通報藥物濫用個案件數計2,273件，濫用之毒品或管制藥品種類(品項)總計為2,644次，通報案件排序為：海洛因1,387人次、(甲基)安非他命723人次、愷他命143人次、唑匹可隆79人次、苯二氮平類藥物70人次。106年1-5月與105年1-5月比較，通報案件增加11.7%，除海洛因、配西汀、美沙冬、唑匹可隆及苯二氮平類藥物之用藥人次比去年增加，其餘包括嗎啡、甲基安非他命、可待因、大麻、MDMA、古柯鹼、愷他命、佐沛眠之用藥人次較去年減少(詳表三、圖二)。自103年1月起，增加台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用個案件數統計，106年5月新興藥物濫用通報案件數共12件，總計10人次，其中以氟甲基安非他命(FMA)最多，共5人次，其次為類大麻活性物質(2人次)、4-甲基乙基卡西酮和Methylone和Mephedrone和Propofol及Thiamylal(各1人次)再其次。(詳表三之一)

四、台灣地區醫療院所通報Benzodiazepines類藥物濫用

106年5月台灣地區醫療院所通報使用Benzodiazepines類藥物者，計70人次，其中以Flunitrazepam (FM2)占最多計58人次。106年1-5月與105年1-5月比較，通報Benzodiazepines類藥物總人次比去年同期增加2.2%，其中Alprazolam、Bromazepam、Clonazepam、Diazepam用藥人次較去年增加，其餘包括Estazolam、Flunitrazepam(FM2)、Ketazolam、Lorazepam、Oxazepam、Oxazolam及Triazolam用藥人次較去年減少。(詳表四)

五、緝獲毒品統計

106年4月檢、警、憲、調等司法機關及財政部關務署緝獲之毒品共計約405.9公斤，緝獲數量排名前三位為：第二級甲基安非他命192.1公斤、第一級古柯鹼177.5公斤、第四級麻黃鹼(原料藥)19.0公斤；106年1-4月緝獲量為1,156.4公斤較105年1-4月毒品緝獲量1,554.2公斤減少25.6%。(詳表五)

*說明：

- 1.為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片、第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。
- 2.麻黃類(毒品先驅原料)包括：麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼。

六、藥物濫用情勢統計分析

(一) 學生藥物濫用統計

106年4月學生藥物濫用統計總計59件，品項分級統計部分：以第三級毒品(愷他命、FM2、一粒眠)最多30件、第二級毒品(安非他命、搖頭丸、大麻)28件次之；各學制統計部分：依序為高中職32件、國中21件、大專校院6件；106年1-4月與105年1-4月比較，濫用人數減少18.2%，第三級毒品施用人數減少41.5%，第二級毒品施用人數增加39.0%，高中職施用毒品人數減少5.7%，國中施用毒品人數減少31.2%，大專校院施用毒品人數增加25.0%。(詳表六，表七)

(二) 新入所觀察勒戒及受戒治人統計

106年5月新入所觀察勒戒為564人，新入所受戒治人為56人，新入所觀察勒戒依年齡排序前三位為：30-39歲(201人，35.6%)、24-29歲(116人，20.6%)、40-49歲(111人，19.7%)。受戒治人依年齡排序前三位為：40-49歲(23人，41.1%)、30-39歲(18人，32.1%)、50歲以上(13人，23.2%)；106年1-5月與105年1-5月比較，新入所觀察勒戒減少2.1%，新入所受戒治人增加6.4%。(詳表八)

(三) 執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計

106年5月執行毒品案件裁判確定有罪人數共計為3,827人，毒品新入監受刑人數共計為1,092人，裁判確定有罪使用之毒品以二級毒品，計2,613人為最多，毒品新入監受刑人使用之毒品以二級毒品，計650人為最多；106年1-5月與105年1-5月比較，裁判確定有罪人數及新入監受刑人數增加12.5及9.9%。(詳表九)

(四) 警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計

106年5月警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件，查獲數合計662人次，其中施用第三級毒品查獲數為464人次占第一位，持有第三級毒品淨重未達20公克查獲人數為143人次占第二位，未滿18歲施用或持有20公克以下第三級毒品之查獲為55人次占第三位；106年1-5月與105年1-5月比較，查獲數合計共減少61.5%。(詳表十)

(五) 查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計

106年5月查獲毒品案件數之毒品總查獲數共5,061件，嫌疑犯人數共計為5,490人，查獲毒品案件數及嫌疑犯人數均以第二級毒品為最多(3,735件、占73.8%，4,028人)、第一級毒品次之(1,214件、占24.0%，1,336人)、第三級毒品排名第三(103件、占2.0%，114人)；106年1-5月與105年1-5月比較，毒品總查獲數增加6.2%，嫌疑犯人數增加6.1%。(詳表十一)

圖 表 目 錄

| | |
|--|----|
| 表一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表..... | 1 |
| 圖一、台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖..... | 15 |
| 表二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表..... | 16 |
| 表二之一、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年5月首次檢出統計表..... | 53 |
| 表二之二、台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年5月通報表統計排名..... | 56 |
| 表三、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表..... | 60 |
| 表三之一、台灣地區醫療院所通報新興濫用藥物之分布統計..... | 61 |
| 圖二、台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖..... | 62 |
| 表四、台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表..... | 63 |
| 表五、緝獲毒品統計表..... | 65 |
| 表六、學生藥物濫用品項分級統計表..... | 69 |
| 表七、學生藥物濫用各學制統計表..... | 70 |
| 表八、新入所觀察勒戒及受戒治人統計表..... | 71 |
| 表九、執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表..... | 73 |
| 表十、警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件統計表..... | 74 |
| 表十一、查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表..... | 76 |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:106/08/29

| 項目 | | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | 較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】 |
|----------------------------------|----------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(a) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(b) | |
| 檢體 | 總件數 | | 187,410 | 193,858 | 222,477 | 237,523 | 284,834 | 293,644 | 258,063 | 261,314 | 23,073 | 111,045 | 250,683 | 24,921 | 96,311 | -13.3 |
| | 總陽性 數 | 實數 | 55,490 | 47,817 | 57,387 | 54,189 | 60,737 | 72,084 | 62,536 | 74,966 | 6,689 | 30,466 | 70,210 | 7,797 | 27,702 | -9.1 |
| | | % | 29.6 | 24.7 | 25.8 | 22.8 | 21.3 | 24.5 | 24.2 | 28.7 | 29.0 | 27.4 | 28.0 | 31.3 | 28.8 | - |
| 嗎啡 | 總件數 | | 167,452 | 169,626 | 193,004 | 199,096 | 237,845 | 226,605 | 202,317 | 203,556 | 18,979 | 91,208 | 208,022 | 19,928 | 77,424 | -15.1 |
| | 總陽性 數 | 實數 | 36,362 | 24,516 | 21,505 | 18,501 | 18,668 | 14,541 | 12,666 | 14,260 | 1,465 | 6,099 | 15,163 | 1,632 | 5,321 | -12.8 |
| | | % | 21.7 | 14.5 | 11.1 | 9.3 | 7.8 | 6.4 | 6.3 | 7.0 | 7.7 | 6.7 | 7.3 | 8.2 | 6.9 | - |
| 甲基安非 他命 | 總件數 | | 184,367 | 190,137 | 216,681 | 228,922 | 276,192 | 269,258 | 209,209 | 146,867 | 14,125 | 65,994 | 155,697 | 18,225 | 64,603 | -2.1 |
| | 總陽性 數 | 實數 | 29,279 | 28,418 | 38,040 | 30,656 | 35,015 | 33,223 | 33,523 | 39,779 | 4,297 | 19,207 | 49,045 | 5,541 | 19,959 | 3.9 |
| | | % | 15.9 | 14.9 | 17.6 | 13.4 | 12.7 | 12.3 | 16.0 | 27.1 | 30.4 | 29.1 | 31.5 | 30.4 | 30.9 | - |
| 愷他命 | 總件數 | | 18,451 | 25,306 | 34,636 | 47,123 | 57,015 | 85,800 | 79,754 | 95,362 | 7,207 | 34,413 | 73,266 | 6,104 | 24,582 | -28.6 |
| | 總陽性 數 | 實數 | 2,999 | 5,620 | 9,338 | 13,754 | 16,006 | 33,447 | 25,183 | 32,406 | 2,143 | 10,015 | 17,442 | 1,835 | 6,312 | -37.0 |
| | | % | 16.3 | 22.2 | 27.0 | 29.2 | 28.1 | 39.0 | 31.6 | 34.0 | 29.7 | 29.1 | 23.8 | 30.1 | 25.7 | - |
| MDMA | 總件數 | | 181,515 | 179,009 | 201,528 | 216,899 | 258,892 | 264,124 | 221,793 | 151,830 | 13,383 | 63,794 | 145,445 | 17,084 | 60,449 | -5.2 |
| | 總陽性 數 | 實數 | 1,097 | 982 | 1,125 | 1,421 | 1,620 | 1,797 | 733 | 666 | 46 | 222 | 533 | 62 | 213 | -4.1 |
| | | % | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - |
| 可待因 | 總件數 | | 167,447 | 169,634 | 193,003 | 199,093 | 237,844 | 226,588 | 202,317 | 201,536 | 18,979 | 91,208 | 208,022 | 19,928 | 77,423 | -15.1 |
| | 總陽性 數 | 實數 | 29,143 | 19,369 | 16,304 | 14,380 | 14,309 | 11,027 | 9,633 | 8,182 | 1,058 | 4,446 | 11,021 | 1,235 | 3,857 | -13.2 |
| | | % | 17.4 | 11.4 | 8.4 | 7.2 | 6.0 | 4.9 | 4.8 | 4.1 | 5.6 | 4.9 | 5.3 | 6.2 | 5.0 | - |
| 檢出 3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西 酮(3) 陽性數 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 檢出 4-甲氧基安非他命 陽性數 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | - |
| 檢出 FM2 陽性數 | | | 23 | 19 | 22 | 22 | 65 | 76 | 84 | 78 | 1 | 22 | 80 | 19 | 48 | 118.2 |
| 檢出 Mephedrone 陽性數 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| 檢出 Methylendioxypropylone 陽性數 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 檢出 Norketamine 陽性數 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 234 | 0 | 10 | 17 | 0 | 16 | 60.0 |
| 檢出 N-氧化嗎啡 陽性數 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：106/08/29

| 項目 | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | 較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】 |
|--------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(a) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(b) | |
| 檢出 四氫大麻酚 陽性數 | | 5 | 4 | 22 | 29 | 44 | 14 | 9 | 38 | 0 | 11 | 24 | 9 | 23 | 109.1 |
| 檢出 佐沛眠 陽性數 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 檢出 愷他命 陽性數 | | 2,409 | 4,438 | 7,388 | 11,616 | 13,468 | 28,920 | 20,992 | 24,560 | 1,543 | 7,523 | 12,855 | 1,319 | 4,102 | -45.5 |
| 檢出 對-甲氧基乙基安非他命 陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | -25.0 |
| 檢出 對位乙醯氨基酚 陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 檢出 對-氯安非他命 陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 檢出 罌粟 陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 檢出(甲基)安非他命陽性數 | | 14,904 | 16,746 | 25,334 | 20,641 | 24,350 | 22,739 | 23,316 | 25,817 | 2,988 | 13,495 | 35,164 | 3,922 | 14,424 | 6.9 |
| 檢出4-甲基阿米雷司陽性數 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 檢出MDA陽性數 | | 13 | 3 | 31 | 2 | 16 | 48 | 19 | 33 | 4 | 7 | 13 | 0 | 5 | -28.6 |
| 檢出MDMA陽性數 | | 633 | 396 | 392 | 504 | 696 | 498 | 231 | 166 | 11 | 62 | 164 | 21 | 92 | 48.4 |
| 檢出PMMA陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 檢出Tramadol 陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 檢出乙醯基可待因陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 檢出大麻陽性數 | | 65 | 66 | 108 | 81 | 127 | 176 | 123 | 77 | 13 | 65 | 177 | 52 | 146 | 124.6 |
| 檢出可待因陽性數 | | 342 | 366 | 531 | 647 | 718 | 590 | 582 | 468 | 52 | 314 | 580 | 58 | 281 | -10.5 |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:106/08/29

| 項目 | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | 較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】 |
|-------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|-------|------|---------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(a) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(b) | |
| 檢出古柯 陽性數 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 檢出美沙冬陽性數 | | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 檢出 硝甲西洋 陽性數 | | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 9 | 800.0 |
| 檢出嗎啡陽性數 | | 4,939 | 3,465 | 3,170 | 3,021 | 3,160 | 2,522 | 1,975 | 3,063 | 175 | 728 | 1,675 | 162 | 591 | -18.8 |
| 同時檢出(甲基)安非他命&Tramadol 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出(甲基)安非他命&大麻皆陽 性數 | | 13 | 13 | 17 | 8 | 12 | 9 | 15 | 16 | 7 | 14 | 25 | 1 | 6 | -57.1 |
| 同時檢出(甲基)安非他命&愷他命皆 陽性數 | | 197 | 605 | 1,172 | 1,160 | 1,498 | 2,864 | 2,527 | 3,058 | 299 | 1,243 | 2,163 | 246 | 785 | -36.8 |
| 同時檢出4-甲氧基安非他命&罌粟 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| 同時檢出FM2&愷他命 皆陽性數 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - |
| 同時檢出MDA&(甲基)安非他命皆陽 性數 | | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | 16 | 2 | 4 | 9 | 0 | 3 | -25.0 |
| 同時檢出MDA&Norketamine 皆陽性 數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出MDA&N-氧化嗎啡 皆陽性 數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出MDA&可待因 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出MDA&愷他命 皆陽性數 | | 12 | 10 | 47 | 2 | 54 | 181 | 128 | 127 | 2 | 10 | 29 | 2 | 4 | -60.0 |
| 同時檢出MDMA&(甲基)安非他命皆陽 性數 | | 113 | 99 | 105 | 57 | 119 | 113 | 38 | 47 | 6 | 14 | 72 | 4 | 17 | 21.4 |
| 同時檢出MDMA&FM2 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:106/08/29

| 項目 | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | 較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】 |
|---------------------------|----|-----|-----|-----|------|------|-------|------|------|------|---------|-------|------|---------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(a) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(b) | |
| 同時檢出MDMA&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出MDMA&天使塵 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出MDMA&可待因 皆陽性數 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -100.0 |
| 同時檢出MDMA&四氫大麻酚 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
| 同時檢出MDMA&硝甲西洋 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出MDMA&愷他命皆陽性數 | | 274 | 363 | 490 | 730 | 672 | 1,030 | 357 | 311 | 16 | 98 | 181 | 28 | 65 | -33.7 |
| 同時檢出N-氧化嗎啡&可待因 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出N-氧化嗎啡&愷他命 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出大麻&MDA 皆陽性數 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出大麻&MDMA皆陽性數 | | 12 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | -100.0 |
| 同時檢出大麻&可待因 皆陽性數 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 100.0 |
| 同時檢出大麻&愷他命 皆陽性數 | | 4 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 12 | 5 | 0 | 4 | 8 | 2 | 5 | 25.0 |
| 同時檢出比重&肌酸酐 皆陽性數 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出可待因&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出可待因&Tramadol皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出可待因&(甲基)安非他命皆陽性數 | | 16 | 16 | 35 | 36 | 41 | 38 | 23 | 27 | 7 | 21 | 42 | 5 | 15 | |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:106/08/29

| 項目 | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | 較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】 |
|---------------------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|------|---------|-------|------|---------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(a) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(b) | |
| 同時檢出可待因&愷他命 皆陽性數 | | 5 | 7 | 7 | 8 | 26 | 32 | 17 | 13 | 1 | 13 | 16 | 0 | 2 | -84.6 |
| 同時檢出古柯 &二氫去氧嗎啡 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出古柯 &大麻 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -100.0 |
| 同時檢出四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | -100.0 |
| 同時檢出甲基安非他命&FM2 皆陽性數 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 500.0 |
| 同時檢出甲基安非他命 &Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
| 同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1,471 | 0 | 401 | 1,322 | 228 | 1,000 | 149.4 |
| 同時檢出甲基安非他命&四氫大麻酚 皆陽性數 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -50.0 |
| 同時檢出甲基安非他命&硝甲西洋 皆陽性數 | | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.0 |
| 同時檢出甲基安非他命&對-甲氧基 乙基安非他命 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| 同時檢出肌酸酐&pH值 皆陽性數 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出硝甲西洋&硝西洋 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&FM2 皆陽性數 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&MDA 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | -100.0 |
| 同時檢出嗎啡&MDMA 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -100.0 |
| 同時檢出嗎啡&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：106/08/29

| 項目 | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | 較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】 |
|------------------------------|----|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|-------|------|---------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(a) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(b) | |
| 同時檢出嗎啡&Tramadol皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&大麻 皆陽性數 | | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.0 |
| 同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數 | | 17,434 | 10,198 | 7,084 | 6,810 | 6,586 | 4,665 | 3,276 | 2,362 | 340 | 1,420 | 3,421 | 387 | 1,260 | -11.3 |
| 同時檢出嗎啡&四氫大麻酚 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&愷他命 皆陽性數 | | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 | 23 | 21 | 47 | 5 | 12 | 17 | 1 | 2 | -83.3 |
| 同時檢出嗎啡及(甲基)安非他命皆陽性數 | | 2,639 | 2,039 | 2,580 | 1,747 | 1,925 | 1,575 | 1,589 | 3,034 | 180 | 789 | 1,982 | 189 | 657 | -16.7 |
| 同時檢出愷他命&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 3,264 | 199 | 799 | 1,581 | 155 | 954 | 19.4 |
| 同時檢出愷他命&咪達唑他 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | - |
| 同時檢出愷他命&硝甲西洋 皆陽性數 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出愷他命&對-甲氧基乙基安非他命 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | - |
| 同時檢出MDA&四氫大麻酚&愷他命皆陽性數 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出MDA&甲基安非他命&可待因皆陽性數 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -100.0 |
| 同時檢出MDA&甲基安非他命&愷他命皆陽性數 | | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 28 | 30 | 23 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | -50.0 |
| 同時檢出MDA&愷他命&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 7 | 13 | 0 | 4 | -42.9 |
| 同時檢出MDMA&(甲基)安非他命&大麻皆陽性數 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出MDMA&(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -100.0 |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位：件數，製表日期：106/08/29

| 項目 | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | 較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】 |
|-------------------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|---------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(a) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(b) | |
| 同時檢出MDMA&FM2&愷他命 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出MDMA&可待因&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出MDMA&可待因&愷他命 皆陽性數 | | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出MDMA&四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出MDMA&甲基安非他命&FM2 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出MDMA&甲基安非他命&可待因 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出MDMA&甲基安非他命&四氫大麻酚 皆陽性數 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出MDMA&甲基安非他命&咪達唑他 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數 | | 52 | 99 | 111 | 113 | 99 | 134 | 83 | 31 | 7 | 22 | 58 | 5 | 17 | -22.7 |
| 同時檢出MDMA&愷他命&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 | 1 | 10 | 28 | 1 | 13 | 30.0 |
| 同時檢出MDMA&愷他命&硝甲西洋 皆陽性數 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 同時檢出大麻&MDA&甲基安非他命 皆陽性數 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出大麻&MDA&愷他命 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出大麻&MDMA&可待因 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -100.0 |
| 同時檢出大麻&MDMA&愷他命 皆陽性數 | | 3 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -100.0 |
| 同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數 | | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | -100.0 |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:106/08/29

| 項目 | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | 較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】 |
|-------------------------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|---------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(a) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(b) | |
| 同時檢出大麻&愷他命&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| 同時檢出可待因&愷他命 &Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 | 2 | -66.7 |
| 同時檢出古柯 &大麻&甲基安非他 命 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -100.0 |
| 同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡 &可待因 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 同時檢出甲基安非他命&N-氧化嗎啡 &愷他命 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72 | 0 | 15 | 20 | 3 | 17 | 13.3 |
| 同時檢出甲基安非他命&可待因&愷 他命 皆陽性數 | | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 33.3 |
| 同時檢出甲基安非他命&四氫大麻酚 &愷他命 皆陽性數 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| 同時檢出甲基安非他命&愷他命 &Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 476 | 44 | 133 | 280 | 44 | 225 | 69.2 |
| 同時檢出甲基安非他命&愷他命&硝 甲西洋 皆陽性數 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 300.0 |
| 同時檢出甲基安非他命&愷他命&對- 甲氧基乙基安非他命 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - |
| 同時檢出嗎啡&(甲基)安非他命 &Tramadol皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&MDA&可待因 皆陽性 數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 同時檢出嗎啡&MDA&甲基安非他命 皆陽性數 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&MDMA&四氫大麻酚 皆陽性數 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&MDMA&愷他命 皆陽 性數 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -100.0 |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:106/08/29

| 項目 | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | 較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】 |
|---------------------------------|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|-------|------|---------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(a) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(b) | |
| 同時檢出嗎啡&大麻&可待因 皆陽性數 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| 同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命 皆陽性數 | | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&可待因&(甲基)安非他命 皆陽性數 | | 11,293 | 8,715 | 8,582 | 6,811 | 6,834 | 5,546 | 5,545 | 4,906 | 662 | 2,613 | 6,857 | 781 | 2,240 | -14.3 |
| 同時檢出嗎啡&可待因&FM2 皆陽性數 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | -50.0 |
| 同時檢出嗎啡&可待因&MDMA 皆陽性數 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&可待因&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -100.0 |
| 同時檢出嗎啡&可待因&甲基安非他命 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 87 | 336 | 793 | 63 | 330 | -1.8 |
| 同時檢出嗎啡&可待因&愷他命 皆陽性數 | | 13 | 14 | 15 | 19 | 28 | 39 | 25 | 17 | 1 | 9 | 13 | 2 | 8 | -11.1 |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&FM2 皆陽性數 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命 &Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -100.0 |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 158 | 0 | 22 | 57 | 9 | 41 | 86.4 |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&四氫大麻酚 皆陽性數 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數 | | 3 | 16 | 17 | 33 | 39 | 57 | 49 | 100 | 2 | 16 | 28 | 1 | 10 | -37.5 |
| 同時檢出嗎啡&美沙冬&可待因 皆陽性數 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&愷他命&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - |
| 同時檢出嗎啡&鴉片&可待因 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:106/08/29

| 項目 | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | 較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】 |
|--|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|---------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(a) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(b) | |
| 同時檢出愷他命&對-甲氧基乙基安非他命&3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 同時檢出MDA&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | -33.3 |
| 同時檢出MDMA&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出MDMA&甲基安非他命&四氫大麻酚&愷他命 皆陽性數 | | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | -60.0 |
| 同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&咪達唑他 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 同時檢出MDMA&甲基安非他命&愷他命&硝甲西洋 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出大麻&MDA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出大麻&MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數 | | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出大麻&MDMA&愷他命&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 同時檢出大麻&甲基安非他命&愷他命&咪達唑他 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 同時檢出甲基安非他命&FM2&愷他命&咪達唑他 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - |
| 同時檢出甲基安非他命&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.0 |
| 同時檢出甲基安非他命&可待因&愷他命&咪達唑他 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&MDA&可待因&愷他命皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:106/08/29

| 項目 | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | 較去年1-5月增減 百分比(%) 【(b-a)/a*100】 |
|------------------------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|---------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(a) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(b) | |
| 同時檢出嗎啡&MDA&甲基安非他命&可待因 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&MDMA&可待因&愷他命 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 同時檢出嗎啡&大麻&MDMA&可待因 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 同時檢出嗎啡&大麻&可待因&甲基安非他命 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因 皆陽性數 | | 13 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | - |
| 同時檢出嗎啡&可待因&(甲基)安非他命&MDMA 皆陽性數 | | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -100.0 |
| 同時檢出嗎啡&可待因&甲基安非他命&愷他命 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -100.0 |
| 同時檢出嗎啡&可待因&愷他命 &Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.0 |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 259 | 0 | 73 | 207 | 27 | 136 | 86.3 |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&愷他命 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -100.0 |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&FM2 皆陽性數 | | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | - |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數 | | 14 | 36 | 37 | 35 | 58 | 102 | 100 | 97 | 7 | 53 | 65 | 3 | 21 | -60.4 |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&四氫大麻酚&可待因 皆陽性數 | | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&消旋甲基安非他命&可待因 皆陽性數 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

表一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計表

單位:件數,製表日期:106/08/29

| 項目 | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | 較去年1-5月增減百分比(%) 【(b-a)/a*100】 |
|---|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|---------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(a) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(b) | |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100.0 |
| 同時檢出MDA&甲基安非他命&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 同時檢出MDMA&甲基安非他命&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -100.0 |
| 同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&可待因&愷他命 皆陽性數 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&大麻&甲基安非他命&愷他命&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&N-氧化嗎啡&可待因&愷他命 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 同時檢出嗎啡&甲基安非他命&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 13 | 1 | 2 | -66.7 |
| 同時檢出嗎啡&MDMA&甲基安非他命&可待因&愷他命&Norketamine 皆陽性數 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |

資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

濫用藥物尿液檢驗相關統計表填表說明

1. 「檢體總件數」係指檢驗尿液檢體之總件數。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總件數」係指有做《檢體/嗎啡/甲基安非他命》檢驗之尿液檢體總件數
2. 「檢體總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出毒品(或管制藥品)成分者之和。一個檢體無論檢驗出一種或多種毒品(或管制藥品)成分，皆只算檢體陽性數一件。「《檢體/嗎啡/甲基安非他命》總陽性數實數」係指尿液檢體有檢驗出《毒品/嗎啡/甲基安非他命》成份者之和。
3. 「%」計算方式為實數除以總件數乘以100，四捨五入至小數點下一位。
4. 「嗎啡總件數」係指有做嗎啡檢驗之尿液檢體總件數。
5. 「檢出○○陽性數」係指尿液檢體中僅檢出○○，而未檢出其他毒品成份者，同時檢出○○&其他毒品成份者不計算在內，但其中檢出MDMA者包括僅檢出MDMA及同時檢出MDMA&MDA者，檢出甲基安非他命者包括僅檢出甲基安非他命或安非他命者及同時檢出甲基安非他命&安非他命者。
6. 「嗎啡總陽性數實數」係指尿液檢體中檢出嗎啡者。不論是單獨檢出嗎啡或同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥成分者，皆只算陽性數一件)。統計報表嗎啡「總件數」及「總陽性數」部分，亦包含鴉片之件數。
7. 「甲基安非他命總件數」係指有做甲基安非他命檢驗之尿液檢體總件數。「甲基安非他命總陽性數實數」，係指尿液檢體中檢出甲基安非他命者。
8. 「檢出(甲基)安非他命陽性數」係指單獨檢出甲基安非他命、單獨檢出安非他命、同時檢出甲基安非他命&安非他命者之和。
9. 「檢出嗎啡陽性數」係指尿液檢體中僅檢出嗎啡，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者，同時檢出嗎啡&其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。「檢出大麻陽性數」、「檢出MDA陽性數」、「檢出可待因 陽性數」、「檢出乙醯基可待因陽性數」、「檢出Tramadol陽性數」、「檢出FM2陽性數」、「檢出ketamine陽性數」等項目依此類推。
10. 「同時檢出(甲基)安非他命&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&甲基安非他命、嗎啡&安非他命、嗎啡&甲基安非他命&安非他命之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含甲基安非他命之項目，依此類推。
11. 「同時檢出MDMA&嗎啡皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&MDMA之和，同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出包含MDMA之項目，依此類推。
12. 「同時檢出嗎啡&可待因皆陽性數」係指尿液檢體中同時檢出嗎啡&可待因兩項，而未檢出其他毒品(或管制藥品)成分者。同時檢出其他毒品(或管制藥品)成分者不計算在內。其他多重檢出項目不包括甲基安非他命及MDMA者，依此類推。


13.(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。

14. 每一檢體之檢驗品項依委驗機構需要而定，並非完全相同；另海洛因在人體中會代謝為嗎啡，故統計表不列海洛因欄。

圖一

台灣地區濫用藥物尿液檢驗統計圖

97年~106年5月



資料來源：衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構、衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部。

註1：海洛因於人體會代謝成嗎啡。

註2：嗎啡、甲基安非他命、愷他命與MDMA同時檢測出之資料，分別包含於嗎啡陽性件數、甲基安非他命、愷他命與MDMA陽性件數統計數據內。

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 102 | 2 | 481 | 0.94 | 15,933.3 | 583 |
| 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0.07 | - | 34 |
| 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.01 | - | 5 |
| 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086 | 1086 | 2.12 | - | 1086 |
| 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 30 | 128 | 0.25 | - | 170 |
| 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、EMC(ethylmethcathinone)、MMB-FUBINACA;FUB-AMB(AMB-FUBINACA)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.02 | - | 10 |
| 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 | 0.07 | - | 36 |
| 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3)) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.01 | - | 5 |
| 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0.02 | - | 10 |
| 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 0.01 | - | 12 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|---|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Fluoxetine(富魯歐西汀)、Chlorzoxazone(氣茶噁唑林)、Imipramine(Imipramine) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0.01 | - | 10 |
| 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 198 | 0.39 | - | 199 |
| 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 92 | 0.18 | - | 92 |
| 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 64 | 0.13 | - | 75 |
| 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.01 | - | 5 |
| 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.01 | - | 8 |
| 2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]-N,N-dimethylacetamide(N,N-二甲基莫待芬寧) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.01 | - | 5 |
| 25B-NBOMe(25B-NBOMe)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0.06 | - | 31 |
| 25B-NBOMe(25B-NBOMe)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.02 | - | 9 |
| 25B-NBOMe(25B-NBOMe)、2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.02 | - | 8 |
| 25B-NBOMe(25B-NBOMe)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.01 | - | 5 |
| 2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺) | | 1 | 6 | 1 | 2 | 22 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.01 | - | 46 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| 2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | - | 120 |
| 3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3)) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 82 | 1172 | 15 | 59 | 114 | 2 | 175 | 0.34 | 196.6 | 1587 |
| 3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 70 | 17 | 52 | 0.10 | -22.4 | 122 |
| 3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 0.19 | - | 98 |
| 3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 722 | 5382 | 26 | 214 | 336 | 1 | 8 | 0.02 | -96.3 | 6468 |
| 3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3)) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0.00 | -88.9 | 70 |
| 3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.03 | - | 15 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|---|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.01 | - | 7 | |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.02 | - | 8 | |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.04 | - | 23 | |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.03 | - | 13 | |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 67 | 266 | 276 | 0 | 35 | 0.07 | -86.8 | 661 |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0.00 | -50.0 | 12 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|---|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.03 | - | 15 | |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.00 | - | 6 | |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 239 | 0 | 110 | 110 | 2 | 9 | 0.02 | -91.8 | 362 |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | - | 28 |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Methcathinone(甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | - | 35 |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、METHOXETAMINE(2-(3-甲氧基苯基)-2-胺環己酮)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯茶噁唑林)、Imipramine(Imipramine) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.06 | - | 30 |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 353 | 353 | 353 | 0 | 1 | 0.00 | -99.7 | 1126 |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 18 | 21 | 166 | 0 | 1 | 0.00 | -95.2 | 206 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|---|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 56 | 115 | 5 | 75 | 0.15 | 33.9 | 345 |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.01 | - | 50 |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.00 | - | 6 |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | - | 8 |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 33 | 1 | 12 | 0.02 | - | 66 |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0.00 | -60.0 | 10 |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、Chloroamphetamine(氯安非他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.04 | - | 18 |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基安非他命)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0.02 | 700.0 | 11 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲安非他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 | 7 | 0.01 | 40.0 | 18 |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命)、PMMA(對-甲氧基甲安非他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 19 | 0.04 | 1,800.0 | 27 |
| 3, 4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3, 4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑))、MDMA(3, 4-亞甲基雙氧甲安非他命)、Methamphetamine(甲安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0.03 | - | 13 |
| 4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 142 | 0.28 | - | 163 |
| 4-Ethylmethylcathinone(4-EMC) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 0 | 4 | 0.01 | -63.6 | 21 |
| 4-Ethylmethylcathinone(4-EMC)、Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.02 | - | 12 |
| 4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命) | | 0 | 0 | 1 | 11 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | - | 38 |
| 4-Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.02 | - | 8 |
| 4-Methyl-N-Ethyl-Pentadrone(4-MEAP) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0.01 | 0.0 | 6 |
| 4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | 0.03 | 1,300.0 | 19 |
| 4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、1-(1, 3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 0.01 | - | 19 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| 4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0.04 | - | 18 |
| 4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0.15 | - | 76 |
| 4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.05 | - | 24 |
| 4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0.15 | - | 77 |
| 4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 0 | 45 | 0.09 | - | 1133 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|---|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| 4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)、meta-Chlorophenylpiperazine(mCPP) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.01 | - | 6 | |
| 4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 139 | 0.27 | - | 164 | |
| 4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 27 | 0 | 20 | 0.04 | 33.3 | 47 |
| 4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Flunitrazepam(氟硝西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0.02 | - | 9 | |
| 4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.02 | - | 8 | |
| 5F-AKB48(5F-AKB48) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0.00 | -50.0 | 29 |
| 5F-AMP(非)(5F-AMB(非)) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74 | 6 | 14 | 0.03 | - | 99 |
| 5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、Ketamine(愷他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | - | 6 |
| 5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.05 | - | 25 | |
| 5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、MMB-FUBINACA;FUB-AMB(AMB-FUBINACA) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.01 | - | 5 | |
| 5F-AMP(非)(5F-AMB(非))、Nicotine(尼古丁) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | - | 6 |
| 5-MeO-DALT(5-MeO-DALT) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0.01 | 600.0 | 10 |
| 5-MeO-DIPT(5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺) | | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 0.02 | 300.0 | 39 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0.00 | -83.3 | 33 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 | |
|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | | | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0.05 | - | 24 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.02 | - | 9 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0.03 | - | 14 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3)) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 20 | 23 | 1 | 4 | 0.01 | -80.0 | 54 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、25I-NBOMe(25I-NBOMe) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0.00 | -80.0 | 8 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 113 | 116 | 0 | 2 | 0.00 | -98.2 | 139 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.01 | - | 5 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0.51 | - | 259 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0.03 | 400.0 | 60 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 110 | 478 | 87 | 95 | 0.19 | -13.6 | 573 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | - | 6 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0.00 | -60.0 | 386 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.00 | - | 5 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0.01 | - | 8 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | - | 5 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.01 | - | 5 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA(Methylone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 10 | 0.02 | 900.0 | 16 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 38 | 0.07 | - | 43 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 16 | 34 | 0.07 | 1,033.3 | 51 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyl tryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.01 | - | 5 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 21 | 40 | 0.08 | 344.4 | 49 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0.02 | - | 12 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlormezanone(Chlormezanone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.01 | - | 6 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N, N-Methylisopropyltryptamine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone)、bk-MDMA, Methylone(3, 4-亞甲基雙氧甲基卡西酮) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 23 | 0 | 201 | 0.39 | 857.1 | 224 |
| 6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡) | | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.01 | 500.0 | 33 |
| AB-CHMINACA(AB-CHMINACA) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 100.0 | 14 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚) | | 66 | 75 | 50 | 49 | 52 | 11 | 21 | 25 | 1 | 7 | 15 | 4 | 16 | 0.03 | 128.6 | 380 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Aspirin(乙醯水楊酸)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0.01 | - | 9 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因) | | 3 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 15 | 0 | 18 | 0.04 | 350.0 | 84 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林) | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0.01 | 33.3 | 23 |
| Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺) | | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 1 | 1 | 0.00 | -50.0 | 34 |
| alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非)) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 25 | 25 | 0 | 2 | 0.00 | -92.0 | 38 |
| alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 44 | 64 | 0 | 2 | 0.00 | -95.5 | 66 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 448 | 599 | 10 | 29 | 0.06 | -93.5 | 628 |
| alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0.01 | -40.0 | 10 |
| alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 66 | 82 | 3 | 4 | 0.01 | -93.9 | 87 |
| alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0.04 | - | 23 |
| alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 167 | 171 | 0 | 64 | 0.13 | -61.7 | 235 |
| alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 224 | 836 | 0 | 1 | 0.00 | -99.6 | 837 |
| alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 201 | 0.39 | 378.6 | 243 |
| Alprazolam(阿普唑他) | | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | 0 | 4 | 19 | 3 | 9 | 0.02 | 125.0 | 79 |
| AM-2201(K2)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)咪唑)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyl tryptamine)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、25I-NBOMe(25I-NBOMe)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 32 | 34 | 0 | 1 | 0.00 | -96.9 | 47 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| Amphetamine(安非他命) | | 1 | 6 | 4 | 269 | 148 | 1106 | 1386 | 1821 | 201 | 750 | 2298 | 192 | 863 | 1.69 | 15.1 | 7902 |
| Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命) | | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 57 | 105 | 75 | 20 | 69 | 162 | 2 | 33 | 0.06 | -52.2 | 441 |
| Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)、Chloroamphetamine(氯安非他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.02 | - | 10 | |
| Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.01 | - | 11 |
| Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命) | | 0 | 0 | 11 | 23 | 14 | 19 | 10 | 15 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 0.00 | 0.0 | 110 |
| Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命) | | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 19 | 18 | 85 | 3 | 13 | 49 | 0 | 3 | 0.01 | -76.9 | 191 |
| Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 0.02 | 800.0 | 22 |
| Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.01 | - | 5 |
| Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命) | | 12 | 13 | 20 | 30 | 53 | 57 | 89 | 56 | 3 | 67 | 100 | 18 | 107 | 0.21 | 59.7 | 537 |
| Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命) | | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | - | 18 |
| Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命) | | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 27 | 30 | 34 | 5 | 18 | 28 | 2 | 18 | 0.04 | 0.0 | 155 |
| Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼) | | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | - | 5 |
| bk-DMBDB(bk-DMBDB) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 6 | 43 | 9 | 36 | 0.07 | 500.0 | 86 |
| bk-DMBDB(bk-DMBDB)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.01 | - | 6 |
| bk-DMBDB(bk-DMBDB)、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone(MPHP)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.04 | - | 20 |
| bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 288 | 317 | 428 | 0.84 | 42,700.0 | 732 |
| bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3)) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0.01 | - | 15 |
| bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ketamine(愷他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.01 | - | 5 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0.04 | - | 35 |
| bk-DMBDB(bk-DMBDB)、N-(4-Ethoxyphenyl)-3-hydroxybutanamide(Bucetin)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基苯胺)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.01 | - | 5 |
| bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 21 | 0.04 | 2,000.0 | 31 |
| bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0.04 | - | 20 |
| bk-MBDB(Butylone)(3,4-亞甲基雙氧甲基苯胺丁酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 147 | 148 | 0 | 1 | 0.00 | -99.3 | 154 |
| bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮) | | 0 | 1 | 7 | 86 | 225 | 288 | 650 | 594 | 6 | 111 | 372 | 0 | 24 | 0.05 | -78.4 | 2247 |
| bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 25 | 98 | 117 | 253 | 1556 | 2781 | 3 | 9 | 572 | 0 | 7 | 0.01 | -22.2 | 5409 |
| bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 13 | 57 | 31 | 53 | 0.10 | 307.7 | 163 |
| bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 4 | 107 | 108 | 1 | 4 | 0.01 | -96.3 | 202 |
| Bromazepam(溴西洋) | | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 100.0 | 20 |
| bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0.13 | - | 69 |
| Brotizolam(4)(伯替唑他) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 | 8 |
| Buprenorphine(丁基原啡因) | | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 13 | 0 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0.01 | 25.0 | 66 |
| Caffeine(咖啡因) | | 33 | 24 | 16 | 109 | 125 | 105 | 2175 | 3519 | 306 | 846 | 3578 | 206 | 1214 | 2.37 | 43.5 | 10898 |
| Caffeine(咖啡因)、Chloroamphetamine(氯安非他命) | | 0 | 114 | 112 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | - | 334 |
| Caffeine(咖啡因)、Ibuprofen(Ibuprofen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0.00 | -80.0 | 7 |
| Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 121 | 233 | 660 | 531 | 1687 | 3.30 | 624.0 | 2697 |
| Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因) | | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | - | 20 |
| Cannabis(大麻) | | 3 | 25 | 142 | 186 | 146 | 154 | 181 | 170 | 23 | 94 | 330 | 58 | 239 | 0.47 | 154.3 | 1576 |
| Cathinone(卡西酮)、Cathine(去甲假麻黃鹼)、Phenylpropanolamine(去甲麻黃鹼) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0.13 | - | 66 |
| Chlormezanone(Chlormezanone) | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | - | 5 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| Chloroephedrine(Chloroephedrine)、 Chloropseudoephedrine(Chloropseudoephedrine) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 34 | 139 | 500 | 20 | 36 | 0.07 | -74.1 | 544 |
| Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.02 | - | 15 |
| Chloromethamphetamine(氯甲基安非他命)、 Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.0 | 8 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3)) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 17 | 99 | 1083 | 24 | 188 | 0.37 | 89.9 | 1693 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1- (1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1- pentanon(N-Ethylpentylone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.01 | - | 5 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1- (1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1- pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡 因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 32 | 0.06 | - | 41 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1- (1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1- pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他 命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.01 | - | 6 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1- (1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1- pentanon(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他 命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡 因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 2 | 0.00 | - | 340 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、1- (1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1- pentanon(N-Ethylpentylone)、PMMA(對-甲氧基 甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.01 | - | 7 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4- chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1- pentanon(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝 甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、 Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.04 | - | 21 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4- chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、 bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、 methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、 Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0.14 | - | 71 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|---|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 161 | 0.31 | - | 201 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.00 | - | 6 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0.10 | - | 51 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 35 | 0.07 | - | 76 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.00 | - | 5 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0.09 | - | 47 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、methylpentdrone; 4-MPD(methylpentdrone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0.04 | - | 33 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、methylpentdrone; 4-MPD(methylpentdrone)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、meta-Chlorophenylpiperazine(mCPP) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.01 | - | 7 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0.00 | - | 18 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | | | | | | | | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | - | 5 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 3 | 0.01 | - | 120 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0.04 | - | 25 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-methyl- α -pyrrolidinohexanophenone(4-methyl- α -pyrrolidinohexanophenone)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0.01 | - | 53 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4'-Methyl- α -pyrrolidinohexiophenone (MPHP)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0.00 | -90.0 | 22 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Benedrone(4-MBC, 4-Methyl-N-benzylcathinone)(2-(苄基氨基)-1-对甲基丙-1-酮) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.01 | - | 6 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3614 | 61 | 453 | 2775 | 38 | 638 | 1.25 | 40.8 | 7027 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.02 | - | 8 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.01 | 200.0 | 5 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)、meta-Chlorophenylpiperazine(mCPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.04 | - | 20 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | 10 | 30 | 0 | 4 | 0.01 | -60.0 | 75 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 627 | 886 | 1 | 58 | 0.11 | -90.7 | 998 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|---|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.01 | - | 5 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0.00 | -94.7 | 20 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 199 | 199 | 203 | 1 | 1 | 0.00 | -99.5 | 212 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0.00 | - | 32 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.02 | - | 8 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3)) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.01 | - | 7 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 4 | 0.01 | - | 25 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 0.01 | - | 18 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | - | 12 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.01 | - | 5 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.01 | - | 7 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.01 | - | 7 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | | | | | | | | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0.00 | - | 25 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0.12 | - | 60 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 125 | 289 | 1079 | 20 | 614 | 1.20 | 112.5 | 1727 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、meta-Chlorophenylpiperazine(mCPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.03 | - | 13 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMA(4-甲氧基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 | 10 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMMA(對-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0.01 | - | 26 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、PMMA(對-甲氧基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0.02 | - | 11 |
| Chlorzoxazone(氯苯噁唑林) | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 | 14 |
| Clonazepam(氯硝西洋) | 14 | 7 | 20 | 32 | 11 | 14 | 15 | 23 | 6 | 13 | 51 | 7 | 15 | 0.03 | 15.4 | 202 |
| Clothiapine(氯噻平) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | - | 6 |
| Cocaine(古柯鹼) | 5 | 14 | 11 | 8 | 13 | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 9 | 0.02 | 350.0 | 81 |
| Codeine(可待因) | 12 | 11 | 2 | 12 | 1 | 7 | 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.00 | -66.7 | 69 |
| Codeine(可待因) | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.00 | -50.0 | 23 |
| desoxy-D2PM(2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.01 | - | 5 |
| Diazepam(安定) | 8 | 35 | 38 | 26 | 9 | 16 | 8 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.01 | 300.0 | 171 |
| Diazepam(安定)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.02 | - | 10 |
| Diclofenac(二克氯吩) | 6 | 6 | 8 | 15 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | - | 45 |
| Dimethyl sulfone(二甲基磺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0.03 | - | 20 |
| Dimethyl sulfone(二甲基磺)、Ketamine(愷他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0.04 | - | 22 |
| Ephedrine(麻黃鹼) | 52 | 40 | 14 | 20 | 15 | 18 | 22 | 96 | 0 | 9 | 15 | 0 | 3 | 0.01 | -66.7 | 295 |
| Ephedrine(麻黃鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼) | 1 | 7 | 2 | 16 | 17 | 6 | 23 | 6 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0.00 | -92.9 | 93 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| Ergotamine(麥角胺鹼) | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 | 51 | 32 | 1 | 4 | 14 | 1 | 8 | 0.02 | 100.0 | 139 |
| Escitalopram(Escitalopram) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | - | 5 |
| Estazolam(舒樂安定) | | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 11 | 2 | 5 | 0.01 | -28.6 | 55 |
| Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1 | 57 | 64 | 0 | 6 | 0.01 | -89.5 | 252 |
| Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 81 | 85 | 0 | 1 | 0.00 | -98.8 | 186 |
| Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 | 7 |
| Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、Ketamine(愷他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0.00 | -83.3 | 59 |
| Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲氧基安非他命)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 24 | 0 | 1 | 0.00 | -92.3 | 25 |
| Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0.00 | 100.0 | 7 |
| Ethylone; bk-MDEA(3;4-methylenedioxy-N-ethylcathin)、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌啶))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0.17 | - | 85 |
| Flunitrazepam(氟硝西洋) | | 127 | 99 | 191 | 191 | 188 | 218 | 188 | 204 | 13 | 108 | 299 | 37 | 173 | 0.34 | 60.2 | 1878 |
| Flunitrazepam(氟硝西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | - | 6 |
| Fluoromethamphetamine(氟甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.00 | - | 12 |
| Flurazepam(氟安定) | | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 | 16 |
| gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 8 | 16 | 9 | 132 | 0.26 | 1,550.0 | 173 |
| GHB(伽瑪羥基丁酸) | | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 28 | 3 | 9 | 73 | 7 | 39 | 0.08 | 333.3 | 156 |
| GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 38 | 44 | 0.09 | 4,300.0 | 55 |
| Heroin(海洛因) | | 18333 | 8893 | 5458 | 6329 | 18166 | 15142 | 17198 | 16499 | 1719 | 6864 | 18020 | 1633 | 8289 | 16.20 | 20.8 | 132327 |
| Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡) | | 0 | 8 | 2 | 2 | 9 | 6 | 16 | 7 | 1 | 4 | 12 | 3 | 7 | 0.01 | 75.0 | 69 |
| Heroin(海洛因)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因) | | 1 | 532 | 817 | 232 | 413 | 449 | 553 | 187 | 7 | 101 | 244 | 14 | 105 | 0.21 | 4.0 | 3533 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|---|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| Heroin(海洛因)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚) | | 14 | 24 | 3 | 12 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | - | 71 |
| Heroin(海洛因)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | | 2 | 805 | 602 | 482 | 278 | 258 | 297 | 330 | 15 | 143 | 273 | 16 | 112 | 0.22 | -21.7 | 3439 |
| Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命) | | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 25 | 31 | 50 | 5 | 29 | 134 | 7 | 36 | 0.07 | 24.1 | 289 |
| Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命) | | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30 | 19 | 37 | 13 | 28 | 73 | 0 | 20 | 0.04 | -28.6 | 189 |
| Heroin(海洛因)、Amphetamine(安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命) | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 21 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 | 45 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因) | | 1635 | 559 | 354 | 232 | 259 | 177 | 206 | 110 | 2 | 20 | 93 | 30 | 71 | 0.14 | 255.0 | 3696 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | | 0 | 39 | 105 | 31 | 27 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.01 | - | 258 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | | 1 | 106 | 112 | 29 | 18 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | - | 293 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Lidocaine(利度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | - | 13 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁) | | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | - | 31 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 | 13 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因) | | 119 | 168 | 34 | 11 | 10 | 64 | 54 | 44 | 3 | 8 | 14 | 0 | 3 | 0.01 | -62.5 | 521 |
| Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因)、Procaine(普卡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | | 0 | 7 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | - | 39 |
| Heroin(海洛因)、Cannabis(大麻) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | -50.0 | 6 |
| Heroin(海洛因)、Codeine(可待因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 | 5 |
| Heroin(海洛因)、Ketamine(愷他命) | | 52 | 48 | 36 | 30 | 23 | 33 | 19 | 35 | 3 | 14 | 24 | 0 | 10 | 0.02 | -28.6 | 310 |
| Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因) | | 59 | 52 | 15 | 14 | 3 | 24 | 15 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0.01 | 50.0 | 196 |
| Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、6-Acetylmorphine(6-乙醯嗎啡)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | - | 35 |
| Heroin(海洛因)、Lidocaine(利度卡因)、Acetylcodeine(乙醯可待因) | | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.01 | 200.0 | 30 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命) | | 82 | 90 | 64 | 80 | 45 | 37 | 20 | 19 | 0 | 12 | 26 | 1 | 12 | 0.02 | 0.0 | 475 |
| Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因) | | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0.01 | 0.0 | 39 |
| Heroin(海洛因)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nicotine(尼古丁) | | 0 | 236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | - | 240 |
| Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡) | | 7 | 15 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0.01 | 0.0 | 58 |
| Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因) | | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 10 | 2 | 8 | 0.02 | 14.3 | 45 |
| Heroin(海洛因)、Morphine(嗎啡)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因) | | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | - | 10 |
| Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁) | | 29 | 24 | 15 | 1 | 21 | 24 | 28 | 37 | 0 | 16 | 34 | 4 | 29 | 0.06 | 81.3 | 242 |
| Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | - | 6 |
| Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、6-Acetylmorphine(6-乙酰嗎啡)、Acetylcodeine(乙酰可待因) | | 0 | 31 | 21 | 8 | 14 | 20 | 18 | 16 | 1 | 6 | 13 | 0 | 14 | 0.03 | 133.3 | 155 |
| Heroin(海洛因)、Nicotine(尼古丁)、Acetylcodeine(乙酰可待因) | | 0 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | -75.0 | 34 |
| Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因) | | 62 | 83 | 29 | 16 | 43 | 48 | 10 | 18 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0.00 | -80.0 | 324 |
| Heroin(海洛因)、Procaine(普卡因)、Acetylcodeine(乙酰可待因) | | 0 | 13 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | - | 32 |
| Hydroxylamine(鹽酸羥亞胺) | | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 46 | 0.09 | - | 75 |
| Ibuprofen(Ibuprofen) | | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0.00 | -50.0 | 29 |
| Ketamine(愷他命) | | 3172 | 5200 | 9272 | 15886 | 18245 | 27179 | 26275 | 28911 | 1598 | 9832 | 19319 | 1749 | 7972 | 15.58 | -18.9 | 161431 |
| Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對乙酰氨基酚) | | 15 | 28 | 27 | 32 | 34 | 35 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 100.0 | 191 |
| Ketamine(愷他命)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 25 | 203 | 27 | 0 | 52 | 53 | 0 | 6 | 0.01 | -88.5 | 331 |
| Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | | 1 | 23 | 8 | 8 | 22 | 37 | 33 | 686 | 4 | 32 | 102 | 13 | 70 | 0.14 | 118.8 | 990 |
| Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 | 6 | 8 | 0.02 | -11.1 | 52 |
| Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、Nicotine(尼古丁) | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0.01 | - | 13 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|---|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| Ketamine(愷他命)、Hydroxylamine(鹽酸羥亞胺) | | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.00 | - | 41 |
| Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因) | | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 20 | 31 | 0.06 | - | 64 |
| Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3)) | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 170 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 25 | 0.05 | 400.0 | 216 |
| Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 147 | 7 | 0 | 19 | 37 | 8 | 34 | 0.07 | 78.9 | 228 |
| Ketamine(愷他命)、Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.00 | - | 58 |
| Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁) | | 21 | 91 | 86 | 153 | 411 | 797 | 594 | 432 | 15 | 158 | 317 | 32 | 243 | 0.47 | 53.8 | 3145 |
| Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋) | | 4 | 9 | 7 | 6 | 6 | 17 | 17 | 23 | 0 | 4 | 15 | 2 | 16 | 0.03 | 300.0 | 120 |
| Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 | 16 | 20 | 0 | 1 | 0.00 | -93.8 | 93 |
| Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3)) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | - | 23 |
| Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋) | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | -50.0 | 5 |
| Ketamine(愷他命)、PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命) | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.01 | - | 9 |
| Lorazepam(勞拉西洋) | | 12 | 13 | 14 | 8 | 5 | 11 | 7 | 10 | 1 | 13 | 18 | 0 | 6 | 0.01 | -53.8 | 104 |
| MBZP(1-methyl-4-benzylpiperazine)、Procaine(普卡因)、N-Benzylpiperazine(BZP) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.01 | - | 7 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命) | | 44 | 19 | 40 | 194 | 86 | 21 | 30 | 35 | 0 | 4 | 22 | 1 | 25 | 0.05 | 525.0 | 516 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Caffeine(咖啡因) | | 10 | 10 | 91 | 9 | 63 | 265 | 206 | 514 | 8 | 77 | 117 | 8 | 38 | 0.07 | -50.6 | 1323 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 | 17 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0.00 | -60.0 | 24 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.01 | - | 5 |
| MDA(3,4-亞甲基雙氧安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.01 | - | 13 |
| MDDMA(MDDMA)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0.01 | 133.3 | 11 |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命) | | 715 | 476 | 394 | 1278 | 1571 | 1190 | 561 | 520 | 9 | 177 | 486 | 22 | 135 | 0.26 | -23.7 | 7326 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|---|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | | 14 | 9 | 33 | 68 | 98 | 256 | 158 | 374 | 3 | 54 | 983 | 145 | 222 | 0.43 | 311.1 | 2215 |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.03 | - | 13 |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0.00 | - | 8 |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命) | | 136 | 193 | 264 | 62 | 84 | 84 | 33 | 23 | 1 | 7 | 20 | 0 | 3 | 0.01 | -57.1 | 902 |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | | 7 | 3 | 10 | 22 | 30 | 27 | 28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.00 | 0.0 | 131 |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋) | | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0.00 | - | 56 |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 41 | 11 | 32 | 62 | 63 | 0 | 2 | 0.00 | -96.8 | 136 |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3)) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0.11 | - | 104 |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | - | 13 |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命) | | 50 | 56 | 40 | 45 | 135 | 12 | 320 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.01 | 200.0 | 672 |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | | 16 | 97 | 57 | 26 | 4 | 36 | 110 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0.03 | - | 366 |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命) | | 9 | 22 | 58 | 42 | 64 | 19 | 14 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0.00 | -50.0 | 250 |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 20 | 31 | 38 | 18 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.01 | 300.0 | 133 |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 1 | 0.00 | 0.0 | 27 |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋) | | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 37 | 14 | 1 | 2 | 12 | 3 | 6 | 0.01 | 200.0 | 81 |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 12 | 8 | 23 | 54 | 67 | 22 | 56 | 0.11 | 3.7 | 160 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | | | | | | | | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Nimetazepam(硝甲西洋)、 Mephedrone(3)(Mephedrone(3)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.06 | - | 32 |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、PMA(4-甲 氧基安非他命)、管制藥品(管制藥品) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0.01 | - | 9 |
| MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | - | 10 |
| Mefenamic acid(Mefenamic acid) | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0.00 | - | 24 |
| Menthol(薄荷腦) | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | - | 22 |
| Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖 啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | - | 12 |
| Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、 Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖 啡因)、Ethenzamide(Ethoxybenzamide)(乙氧基 苯胺) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0.02 | - | 15 |
| Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk- MDMA(Methylone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 15 | 0.03 | 200.0 | 21 |
| Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk- MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮) | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 356 | 65 | 1 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0.02 | 80.0 | 451 |
| Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk- MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、 Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 43 | 3982 | 573 | 1 | 11 | 17 | 0 | 3 | 0.01 | -72.7 | 4642 |
| Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖 啡因) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 128 | 1992 | 61 | 0 | 26 | 283 | 28 | 158 | 0.31 | 507.7 | 2637 |
| Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖 啡因)、bk-MDMA(Methylone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 0.02 | - | 23 |
| Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、 Chlorzoxazone(氣苯噁唑林)、bk- MDMA(Methylone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0.08 | - | 40 |
| Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.06 | - | 33 |
| Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖 啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 18 | 0.04 | - | 29 |
| Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、 Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖 啡因)、 bk-MDMA(Methylone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.01 | - | 6 |
| Mephedrone(Mephedrone) | 0 | 0 | 102 | 34 | 12 | 33 | 297 | 212 | 1 | 86 | 292 | 123 | 440 | 0.86 | 411.6 | 1422 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| Mephentermine(美芬丁胺) | | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | - | 14 |
| Methadone(美沙冬) | | 7 | 43 | 49 | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.00 | - | 123 |
| Methamphetamine(甲基安非他命) | | 11158 | 11697 | 13886 | 14305 | 15783 | 14843 | 18893 | 21118 | 1879 | 10119 | 28195 | 2631 | 12921 | 25.25 | 27.7 | 162799 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | | 17 | 74 | 21 | 33 | 43 | 5 | 22 | 276 | 28 | 58 | 65 | 4 | 23 | 0.04 | -60.3 | 579 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2 | 5 | 0.01 | - | 80 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃鹼) | | 137 | 39 | 12 | 52 | 27 | 15 | 60 | 48 | 0 | 4 | 60 | 1 | 32 | 0.06 | 700.0 | 482 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ephedrine(麻黃鹼)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼) | | 6 | 9 | 2 | 18 | 17 | 20 | 115 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.01 | 300.0 | 195 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Flunitrazepam(氟硝西洋) | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | - | 16 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命) | | 28 | 58 | 70 | 77 | 50 | 51 | 111 | 84 | 6 | 30 | 54 | 1 | 15 | 0.03 | -50.0 | 598 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0.00 | -92.3 | 14 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁) | | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | - | 11 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋) | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.02 | - | 18 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0.00 | -71.4 | 10 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.00 | -66.7 | 7 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.01 | - | 5 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Methylephedrine(甲基麻黃鹼) | | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 46 | 46 | 0.09 | - | 81 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命) | | 12 | 4 | 15 | 20 | 6 | 4 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.01 | 600.0 | 82 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | - | 6 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|---|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 0.57 | - | 293 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋) | | 15 | 7 | 3 | 1 | 9 | 6 | 0 | 6 | 1 | 4 | 10 | 6 | 26 | 0.05 | 550.0 | 83 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 19 | 2 | 22 | 0.04 | 2,100.0 | 48 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 18 | 1 | 18 | 0.04 | 350.0 | 56 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 32 | 2 | 4 | 0.01 | 0.0 | 38 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Pseudoephedrine(假麻黃鹼) | | 3 | 23 | 50 | 56 | 56 | 11 | 17 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0.01 | 250.0 | 232 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、Tetrahydrocannabinol(四氫大麻鹼) | | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.0 | 27 |
| Methoxymethcathinone(甲氧基甲基卡西酮) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 676 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0.00 | - | 687 |
| Methylenedioxypropylamphetamine(MDPV)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | - | 1079 |
| Methylephedrine(甲基麻黃鹼) | | 29 | 34 | 10 | 51 | 42 | 18 | 237 | 26 | 1 | 9 | 10 | 0 | 13 | 0.03 | 44.4 | 470 |
| Methylephedrine(甲基麻黃鹼)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.01 | - | 22 |
| methylpentdrone; 4-MPD(methylpentdrone)、Ketamine(愷他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0.00 | - | 81 |
| methylpentdrone; 4-MPD(methylpentdrone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.02 | - | 10 |
| Midazolam(咪達唑他) | | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 100.0 | 14 |
| MMB-FUBINACA; FUB-AMB(AMB-FUBINACA) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 0.02 | - | 17 |
| Modafinil(莫待芬寧) | | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 12 | 1 | 5 | 8 | 1 | 6 | 0.01 | 20.0 | 46 |
| Morphine(嗎啡) | | 19 | 8 | 12 | 12 | 20 | 13 | 15 | 9 | 0 | 2 | 17 | 2 | 13 | 0.03 | 550.0 | 138 |
| N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命) | | 35 | 5 | 3 | 49 | 5 | 6 | 3 | 12 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0.00 | -92.9 | 133 |
| naloxone(naloxone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | -50.0 | 11 |
| naloxone(naloxone)、Buprenorphine(丁基原啡因) | | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 25 | 24 | 0 | 9 | 31 | 1 | 11 | 0.02 | 22.2 | 116 |
| naloxone(naloxone)、Heroin(海洛因)、Buprenorphine(丁基原啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 | 6 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| Nicotine(尼古丁) | | 3 | 15 | 16 | 27 | 25 | 50 | 45 | 38 | 3 | 20 | 52 | 6 | 16 | 0.03 | -20.0 | 287 |
| Nimetazepam(硝甲西洋) | | 316 | 346 | 305 | 336 | 949 | 407 | 312 | 310 | 35 | 231 | 542 | 36 | 203 | 0.40 | -12.1 | 4026 |
| Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 8 | 7 | 18 | 22 | 36 | 67 | 98 | 565 | 2 | 48 | 77 | 9 | 84 | 0.16 | 75.0 | 982 |
| Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、 bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 12 | 30 | 160 | 0 | 29 | 0.06 | -3.3 | 256 |
| Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、 Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 90 | 124 | 729 | 890 | 3283 | 6.42 | 2,547.6 | 4028 |
| Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、 Mephedrone(Mephedrone)、bk- MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.0 | 15 |
| Nimetazepam(硝甲西洋)、 Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡 因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.01 | 200.0 | 12 |
| Nimetazepam(硝甲西洋)、 Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 | 1058 | 1073 | 2.10 | - | 1120 |
| Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋) | | 4 | 8 | 3 | 7 | 5 | 21 | 18 | 8 | 4 | 8 | 15 | 2 | 25 | 0.05 | 212.5 | 114 |
| NM-2201, CBL-2201(NM-2201) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.01 | - | 5 |
| N-methyltryptamine(NMT)、DMT(二甲基色胺) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0.13 | - | 67 |
| PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5- yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N- Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因)、 Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0.08 | - | 42 |
| PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5- yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N- Ethylpentylone)、 Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡 因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.02 | - | 10 |
| PENTYLONE(PENTYLONE)、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol- 5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N- Ethylpentylone)、3,4-methylenedioxy-N- ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧- N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯 甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.01 | - | 6 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | | | | | | | | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| PENTYLONE(PENTYLONE)、4-chloroethcathinone(4-CEC)(氯乙基卡西酮)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.02 | - | 8 |
| phenazepam(芬納西洋) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 | 910 | 156 | 6 | 24 | 129 | 32 | 156 | 0.30 | 550.0 | 1440 |
| phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、25B-NBOMe(25B-NBOMe)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 0.06 | - | 31 |
| phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.01 | - | 6 |
| phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0.05 | - | 28 |
| phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0.05 | - | 24 |
| phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29 | 64 | 0.13 | - | 70 |
| phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.01 | - | 6 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|---|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.01 | - | 6 | |
| phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 0.01 | - | 51 | |
| phenazepam(芬納西洋)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 12 | 17 | 1 | 0.00 | -91.7 | 79 | |
| phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(4-CEC)(氯乙基卡西酮)、3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.01 | - | 6 | |
| phenazepam(芬納西洋)、4-chloroethcathinone(4-CEC)(氯乙基卡西酮)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0.29 | - | 150 | |
| phenazepam(芬納西洋)、4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、Ketamine(愷他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.02 | - | 12 | |
| phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0.08 | - | 39 | |
| phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0.09 | - | 48 | |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | | | | | | | | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.01 | - | 5 |
| phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.01 | - | 5 |
| phenazepam(芬納西洋)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.01 | - | 5 |
| phenazepam(芬納西洋)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 0 | 20 | 0.04 | 122.2 | 30 |
| phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 23 | 0.04 | - | 36 |
| phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0.07 | - | 38 |
| phenazepam(芬納西洋)、bromoethcathinone(溴乙基卡西酮)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Mephedrone(Mephedrone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.01 | - | 6 |
| phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 261 | 0 | 1 | 20 | 28 | 76 | 0.15 | 7,500.0 | 405 |
| phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 44 | 78 | 0.15 | 1,460.0 | 159 |
| phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 206 | 5 | 78 | 0.15 | 3,800.0 | 287 |
| phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 61 | 0 | 1 | 0.00 | -93.8 | 67 |
| phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.01 | - | 7 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0.01 | - | 43 |
| phenazepam(芬納西洋)、Delorazepam(地洛西洋) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.01 | - | 6 |
| phenazepam(芬納西洋)、Ketamine(愷他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | - | 10 |
| phenazepam(芬納西洋)、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.01 | - | 7 |
| phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | - | 212 |
| phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 18 | 0.04 | - | 54 |
| phenazepam(芬納西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.03 | - | 14 |
| phenazepam(芬納西洋)、Methamphetamine(甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0.00 | - | 12 |
| phenazepam(芬納西洋)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0.01 | - | 14 |
| Phenylpropanolamine(去甲麻黃鹼) | | 15 | 11 | 0 | 10 | 21 | 38 | 137 | 66 | 2 | 25 | 53 | 7 | 24 | 0.05 | -4.0 | 375 |
| PMA(4-甲氧基安非他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 57 | 0 | 1 | 28 | 1 | 12 | 0.02 | 1,100.0 | 101 |
| PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 3 | 29 | 1 | 2 | 5 | 10 | 23 | 0.04 | 1,050.0 | 92 |
| PMA(4-甲氧基安非他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0.01 | 50.0 | 10 |
| PMA(4-甲氧基安非他命)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | - | 8 |
| PMEA(3)(對-甲氧基乙基安非他命) | | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.01 | - | 24 |
| PMMA(對-甲氧基甲基安非他命) | | 91 | 60 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 16 | 36 | 0 | 18 | 0.04 | 12.5 | 317 |
| PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 1 | 8 | 29 | 1 | 5 | 0.01 | -37.5 | 985 |
| PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.01 | 50.0 | 7 |
| Propranolol(心臟病藥) | | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.00 | - | 9 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| Pseudoephedrine(假麻黃) | | 19 | 101 | 96 | 114 | 175 | 94 | 60 | 57 | 1 | 12 | 29 | 5 | 15 | 0.03 | 25.0 | 760 |
| Psilocine(裸頭草辛) | | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.01 | - | 7 |
| Quetiapine(思樂康) | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.00 | 100.0 | 15 |
| Sildenafil(威而剛) | | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 7 | 10 | 0 | 2 | 29 | 7 | 26 | 0.05 | 1,200.0 | 88 |
| Tadalafil(Tadalafil) | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | - | 5 |
| Tetracaine(得特康) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0.07 | - | 36 |
| Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚) | | 567 | 440 | 159 | 161 | 144 | 171 | 201 | 221 | 4 | 105 | 196 | 28 | 150 | 0.29 | 42.9 | 2410 |
| Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、 cannabinol(大麻酚) | | 0 | 3 | 10 | 16 | 22 | 20 | 55 | 19 | 0 | 10 | 54 | 18 | 67 | 0.13 | 570.0 | 266 |
| Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、 Ketamine(愷他命) | | 11 | 15 | 4 | 4 | 14 | 26 | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.01 | 300.0 | 98 |
| Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、 Ketamine(愷他命)、cannabinol(大麻酚) | | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0.01 | 200.0 | 31 |
| Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、 Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁) | | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.00 | -75.0 | 31 |
| Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、 Nicotine(尼古丁) | | 12 | 20 | 13 | 14 | 24 | 18 | 19 | 30 | 1 | 11 | 30 | 2 | 21 | 0.04 | 90.9 | 201 |
| Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚)、 Nicotine(尼古丁)、cannabinol(大麻酚) | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0.01 | 600.0 | 19 |
| Theobromine(Theobromine)、3,4- methylenedioxy-N- ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧- N-乙基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 12 | 0.02 | 71.4 | 29 |
| Theobromine(Theobromine)、3,4- methylenedioxy-N- ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧- N-乙基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、 Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0.01 | -50.0 | 16 |
| Theobromine(Theobromine)、4- Methylethcathinone(4-甲基乙基卡西酮)、 PENTYLONE(PENTYLONE)、1-(1,3-benzodioxol-5- yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N- Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、 Mephedrone(3)(Mephedrone(3)) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.01 | - | 7 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| Theobromine(Theobromine)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.01 | - | 7 |
| Theobromine(Theobromine)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 | 14 | 0 | 6 | 0.01 | -50.0 | 41 |
| Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3)) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0.01 | - | 10 |
| Theobromine(Theobromine)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Nimetazepam(硝甲西洋) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.01 | - | 5 |
| Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3)) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0.00 | - | 38 |
| Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.01 | 33.3 | 9 |
| Theobromine(Theobromine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 2 | 10 | 0.02 | -28.6 | 30 |
| Theobromine(Theobromine)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 25 | 0.05 | 2,400.0 | 27 |
| Theophylline(氨基乙酸鈉茶鹼) | | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | - | 9 |
| TMCP-018(UR-144; KM-X1; MN-001) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0.01 | - | 13 |
| Tramadol(特拉嗎竇) | | 13 | 16 | 27 | 19 | 31 | 22 | 19 | 11 | 1 | 3 | 11 | 0 | 6 | 0.01 | 100.0 | 175 |
| Tramadol(特拉嗎竇)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚) | | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 | 18 |
| Trazodone(曲唑酮) | | 11 | 7 | 10 | 17 | 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 13 | 22 | 2 | 11 | 0.02 | -15.4 | 112 |
| Trifluoromethylphenylpiperazine(三氟甲苯哌嗪) | | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | - | 39 |
| Trifluoromethylphenylpiperazine(三氟甲苯哌嗪)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0.02 | 400.0 | 38 |
| UR-144(UR-144) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | - | 5 |
| Vanillin(香荳蔻醛) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.01 | - | 16 |
| Vanillin(香荳蔻醛)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.00 | - | 8 |
| XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)哌嗪)) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.00 | 0.0 | 44 |

表二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體統計表

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分(a) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比 (%)【(d-c)/c*100】 | 歷年總件數 |
|--|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月小計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| 總計(b) | | 37,601 | 31,740 | 33,962 | 42,352 | 59,239 | 65,429 | 83,623 | 100,367 | 7,742 | 36,392 | 96,014 | 12,916 | 51,174 | 100 | 40.6 | 601,501 |
| XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯 吡啶))、Ketamine(愷他命) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | - | 8 |
| XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯 吡啶))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、 Methamphetamine(甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基 安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他 命)、Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0.06 | - | 33 |
| XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯 吡啶))、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、 Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.02 | - | 8 |
| XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯 吡啶))、Methamphetamine(甲基安非他命)、 GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、 Caffeine(咖啡因) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.01 | - | 7 |
| Zolpidem(佐沛眠) | | 24 | 22 | 19 | 21 | 23 | 18 | 22 | 47 | 0 | 5 | 38 | 2 | 11 | 0.02 | 120.0 | 245 |
| Zopiclone(唑匹可隆) | | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0.01 | 600.0 | 35 |

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、
高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、
衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院。

註1：自91年6月起，“檢出成分”排列順序將依英文字母A至Z依序排序，方便查閱。

註2：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品。

註3：列出歷年總件數≥5之檢出成份。

註4：列出當年件數>0之檢出成份。

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年5月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 106/09/01

| 檢出成分 | 月份 | 歷年總件數 |
|--|--------------|--------------|
| | 106年 5月 | |
| 總計 | 1,874 | 1,874 |
| 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因) | 34 | 34 |
| 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | 1086 | 1086 |
| 2-[(Diphenylmethyl)sulfinyl]-N,N-dimethylacetamide(N,N-二甲基莫待芬寧) | 5 | 5 |
| 25B-NBOMe(25B-NBOMe)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因) | 31 | 31 |
| 25B-NBOMe(25B-NBOMe)、2C-B(4-溴2,5-二甲氧基苯乙基胺) | 8 | 8 |
| 3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命) | 98 | 98 |
| 3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命) | 13 | 13 |
| 4-methyl- α -ethylaminopentiophenone(4-methyl- α -ethylaminopentiophenone)、methylpentedrone; 4-MPD(methylpentedrone) | 8 | 8 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | 24 | 24 |
| 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone) | 12 | 12 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年5月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數, 製表日期: 106/09/01

| 檢出成分 | 月份 | 歷年總件數 |
|--|--------------|--------------|
| | 106年 5月 | |
| 總計 | 1,874 | 1,874 |
| Amphetamine(安非他命)、Ketamine(愷他命)、Chloroamphetamine(氯安非他命) | 10 | 10 |
| bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林) | 20 | 20 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Benzedrone(4-MBC, 4-Methyl-N-benzylcathinone)(2-(苄基氨基)-1-对甲苯基丙-1-酮) | 6 | 6 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone) | 8 | 8 |
| Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Ketamine(愷他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因) | 5 | 5 |
| Diazepam(安定)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Nitrazepam(硝西洋) | 10 | 10 |
| Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、bk-MDMA(Methylone) | 40 | 40 |
| Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone) | 293 | 293 |
| phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | 24 | 24 |
| phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | 39 | 39 |
| phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone) | 5 | 5 |
| phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone) | 5 | 5 |

表二之一

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年5月首次檢出統計表

(Statistical Table for Drugs First time found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位:案件數，製表日期：106/09/01

| 檢出成分 | 月份 | 歷年總件數 |
|---|--------------|--------------|
| | 106年 5月 | |
| 總計 | 1,874 | 1,874 |
| phenazepam(芬納西洋)、alpha-PVP(非)(alpha-Pyrrolidinovalerophenone(非))、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3)) | 5 | 5 |
| phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林) | 38 | 38 |
| phenazepam(芬納西洋)、Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Methamphetamine(甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | 7 | 7 |
| XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | 33 | 33 |
| XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、Methamphetamine(甲基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | 7 | 7 |

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院。

註：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年5月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：106/09/01

| 排序 | 檢出成分(a) | 年度 | 106年 | |
|----|--|----|---------------|---------------------------|
| | | | 5月(a) | 5月小計百分比(%) 【(a/b)*100】 |
| | 總計(b) | | 12,916 | 100 |
| 1 | Methamphetamine(甲基安非他命) | | 2,631 | 20.4 |
| 2 | Ketamine(愷他命) | | 1,749 | 13.5 |
| 3 | Heroin(海洛因) | | 1,633 | 12.6 |
| 4 | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 1,086 | 8.4 |
| 5 | Nimetazepam(硝甲西洋)、Mephedrone(Mephedrone) | | 1,057 | 8.2 |
| 6 | Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 890 | 6.9 |
| 7 | Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 559 | 4.3 |
| 8 | bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因) | | 317 | 2.5 |
| 9 | Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone) | | 293 | 2.3 |
| 10 | Caffeine(咖啡因) | | 206 | 1.6 |
| 11 | Amphetamine(安非他命) | | 192 | 1.5 |
| 12 | MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Caffeine(咖啡因) | | 145 | 1.1 |
| 13 | Mephedrone(Mephedrone) | | 123 | 1.0 |
| 14 | 3,4-methylenedioxy-N-ethylcathinone, Ethylone(3)(3,4-亞甲基雙氧-N-乙基卡西酮(3))、Amphetamine(安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、N,N-Dimethylamphetamine(N,N-二甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、PMMA(對-甲氧基甲基安非他命)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone)、4-fluoroamphetamine(4-氟安非他命) | | 98 | 0.8 |
| 15 | 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 87 | 0.7 |

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年5月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：106/09/01

| 排序 | 檢出成分(a) | 年度 | 106年 | |
|----|--|----|---------------|---------------------------|
| | | | 5月(a) | 5月小計百分比(%) 【(a/b)*100】 |
| | 總計(b) | | 12,916 | 100 |
| 16 | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 68 | 0.5 |
| 17 | Cannabis(大麻) | | 58 | 0.4 |
| 18 | Methamphetamine(甲基安非他命)、Methylephedrine(甲基麻黃) | | 46 | 0.4 |
| 19 | Hydroxylamine(鹽酸羥亞胺) | | 45 | 0.3 |
| 20 | phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 44 | 0.3 |
| 21 | Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林)、bk-MDMA(Methylone) | | 40 | 0.3 |
| 22 | phenazepam(芬納西洋)、5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 39 | 0.3 |
| 23 | Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、Caffeine(咖啡因) | | 38 | 0.3 |
| 24 | GHB(伽瑪羥基丁酸)、gamma-Butyrolactone(gamma-Butyrolactone) | | 38 | 0.3 |
| 25 | phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林) | | 38 | 0.3 |
| 26 | Flunitrazepam(氟硝西洋) | | 37 | 0.3 |
| 27 | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Acetaminophen(對位乙醯氨基酚)、Caffeine(咖啡因) | | 34 | 0.3 |
| 28 | Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3))、4-chloroethcathinone (4-CEC)(氯乙基卡西酮)、Caffeine(咖啡因) | | 34 | 0.3 |
| 29 | XLR-11((1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲醯)吡啶))、MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命)、Methamphetamine(甲基安非他命)、PMA(4-甲氧基安非他命)、GHB(伽瑪羥基丁酸)、Ketamine(愷他命)、Caffeine(咖啡因) | | 33 | 0.3 |
| 30 | Ketamine(愷他命)、Nicotine(尼古丁) | | 32 | 0.2 |
| 31 | 25B-NBOMe(25B-NBOMe)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanone(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因) | | 31 | 0.2 |

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年5月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位：案件數，製表日期：106/09/01

| 排序 | 檢出成分(a) | 年度 | 106年 | |
|----|--|----|---------------|---------------------------|
| | | | 5月(a) | 5月小計百分比(%) 【(a/b)*100】 |
| | 總計(b) | | 12,916 | 100 |
| 32 | bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 31 | 0.2 |
| 33 | 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因) | | 30 | 0.2 |
| 34 | Heroin(海洛因)、Caffeine(咖啡因) | | 30 | 0.2 |
| 35 | phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、25B-NBOMe(25B-NBOMe)、Caffeine(咖啡因) | | 30 | 0.2 |
| 36 | phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、Caffeine(咖啡因) | | 29 | 0.2 |
| 37 | Tetrahydrocannabinol(四氫大麻酚) | | 28 | 0.2 |
| 38 | phenazepam(芬納西洋)、Caffeine(咖啡因) | | 27 | 0.2 |
| 39 | 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮) | | 26 | 0.2 |
| 40 | 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 24 | 0.2 |
| 41 | Chloromethcathinone(3)(氯甲基卡西酮(3)) | | 24 | 0.2 |
| 42 | phenazepam(芬納西洋)、1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)-1-pentanon(N-Ethylpentylone)、bk-MDMA, Methylone(3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮)、Caffeine(咖啡因)、Mephedrone(Mephedrone) | | 24 | 0.2 |
| 43 | phenazepam(芬納西洋)、bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Caffeine(咖啡因) | | 23 | 0.2 |
| 44 | Nimetazepam(硝甲西洋) | | 22 | 0.2 |
| 45 | 5-MeO-MIPT(5-Methoxy-N,N-Methylisopropyltryptamine)、Mephedrone(3)(Mephedrone(3))、Caffeine(咖啡因)、bk-MDMA(Methylone) | | 21 | 0.2 |
| 46 | MDMA(3,4-亞甲基雙氧甲基安非他命) | | 21 | 0.2 |
| 47 | bk-DMBDB(bk-DMBDB)、Nimetazepam(硝甲西洋)、Caffeine(咖啡因)、Chlorzoxazone(氯苯噁唑林) | | 20 | 0.2 |

表二之二

台灣地區檢驗涉嫌毒品及管制藥品案件之非尿液檢體106年5月通報表統計排名

(Statistical Table for Drugs found in Drugs and Controlled Drugs Involved Cases in Taiwan)

單位： 案件數，製表日期：106/09/01

| 排序 | 檢出成分(a) | 年度 | 106年 | |
|----|---|----|---------------|---------------------------|
| | | | 5月(a) | 5月小計百分比(%) 【(a/b)*100】 |
| | 總計(b) | | 12,916 | 100 |
| 48 | Chloroephedrine(Chloroephedrine)、Chloropseudoephedrine(Chloropseudoephedrine) | | 20 | 0.2 |
| 49 | Ketamine(愷他命)、Lidocaine(利度卡因) | | 20 | 0.2 |
| 50 | phenazepam(芬納西洋) | | 19 | 0.1 |

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署、法務部調查局、內政部警政署刑事警察局、國防部憲兵指揮部、臺北市政府警察局刑事鑑識中心、高雄市立凱旋醫院、臺灣檢驗科技股份有限公司濫用藥物台北實驗室、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、慈濟大學濫用藥物檢驗中心、衛生福利部草屯療養院、台北榮民總醫院、交通部民用航空局航空醫務中心、中山醫學大學附設醫院。

註1：品項後面括號內之阿拉伯數表示管制級數。(2)係指第二級管制藥品；(3)係指第三級管制藥品；(4)係指第四級管制藥品；(非)係指非管制藥品。

表三

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用藥物之種類分布統計表

單位：人次，製表日期：106/09/01

| 年度 種類(a) | | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | 較去年1-5月增減 百分比(%)【(d- c)/c*100】 | |
|---------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|-------------|-------|---------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 5月 | 1-5月(c) | 1-12月 合計 | 5月 | 1-5月(d) | | 1-5月小計百分 比(%) 【(d/b)*100】 |
| 海洛因 | Heroin | 20,096 | 17,657 | 17,169 | 14,020 | 12,429 | 13,458 | 11,298 | 11,697 | 1,268 | 5,686 | 14,036 | 1,387 | 6,758 | 64.8 | 18.9 |
| 嗎啡 | Morphine | 56 | 88 | 65 | 70 | 39 | 47 | 59 | 120 | 10 | 64 | 110 | 9 | 20 | 0.2 | -68.8 |
| (甲基)安非他命 | Methamphetamine, Amphetamine | 5,683 | 5,393 | 4,929 | 4,595 | 6,006 | 4,704 | 4,869 | 5,672 | 651 | 2,937 | 6,587 | 723 | 2,991 | 28.7 | 1.8 |
| 可待因 | Codeine | 9 | 6 | 5 | 12 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | -100.0 |
| 大麻 | Cannabis | 55 | 28 | 59 | 87 | 110 | 89 | 87 | 114 | 20 | 76 | 179 | 23 | 65 | 0.6 | -14.5 |
| 配西汀 | Pethidine | 66 | 43 | 46 | 64 | 44 | 28 | 33 | 28 | 2 | 5 | 16 | 0 | 6 | 0.1 | 20.0 |
| 搖頭丸 | MDMA | 147 | 56 | 148 | 279 | 623 | 848 | 746 | 624 | 76 | 344 | 730 | 48 | 198 | 1.9 | -42.4 |
| 古柯鹼 | Cocaine | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.0 | -33.3 |
| 美沙冬 | Methadone | 1 | 34 | 8 | 10 | 6 | 4 | 105 | 96 | 14 | 61 | 163 | 15 | 75 | 0.7 | 23.0 |
| 潘他唑新 (速賜康) | Pentazocine | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
| 特拉嗎竇 | Tramadol | 26 | 11 | 10 | 18 | 14 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.0 | - |
| 愷他命 | Ketamine | 200 | 201 | 274 | 403 | 910 | 1,421 | 1,627 | 1,556 | 276 | 1,353 | 2,904 | 143 | 620 | 5.9 | -54.2 |
| 唑匹可隆 | Zopiclone | 35 | 42 | 38 | 25 | 27 | 10 | 7 | 7 | 1 | 6 | 71 | 79 | 325 | 3.1 | 5316.7 |
| 佐沛眠 | Zolpidem | 335 | 349 | 366 | 394 | 869 | 977 | 992 | 750 | 92 | 374 | 816 | 14 | 117 | 1.1 | -68.7 |
| 苯二氮平類 | Benzodiazepines | 442 | 421 | 345 | 428 | 443 | 642 | 567 | 611 | 67 | 319 | 787 | 70 | 326 | 3.1 | 2.2 |
| 其他 | Others | 235 | 71 | 38 | 24 | 165 | 194 | 211 | 272 | 17 | 90 | 395 | 130 | 461 | 4.4 | 412.2 |
| 總計 | Sum | 27,396 | 24,408 | 23,501 | 20,431 | 21,696 | 22,433 | 20,609 | 21,555 | 2,496 | 11,322 | 26,802 | 2,644 | 11,967 | - | 5.7 |
| 通報個案數(件)(b) | Number of case(b) | 21,610 | 19,126 | 18,792 | 16,822 | 18,562 | 19,535 | 17,905 | 18,399 | 2,048 | 9,329 | 22,412 | 2,273 | 10,423 | - | 11.7 |

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註2：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：92年起“其他”指品項不明之藥物。

註4：自92年5月起，因考量各醫療院所補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。

註5：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註6：占通報個案數(件)百分比係指“人次/總個案數”。本表之小計百分比為占通報個案數(件)百分比。

註7：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/總人次”。

註8：甲基安非他命係指包括安非他命與甲基安非他命之總和。

註9：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

表三之一

台灣地區醫療院所通報新興藥物濫用之分布統計表

單位：人次，製表日期：106/09/01

| 種類(a) | 月份 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | 1-5月佔通報個案數(件)百分比(註4) | 1-5月佔藥物濫用總人次百分比(註5) | 較去年1-5月同期增減百分比【(e-d)/d*100】 |
|----------------|----------------------|------|------|------|---------|-------|------|---------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | 合計 | 合計 | 5月 | 1-5月(d) | 1-12月 | 5月 | 1-5月(e) | | | |
| 4-甲基乙基卡西酮 | 4-Methylethcathinone | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5.7 | 5.1 | - |
| 火狐狸 | 5-Meo-DIPT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 3,4-亞甲基雙氧甲基卡西酮 | bk-MDMA、Methylone | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5.7 | 5.1 | - |
| 氣安非他命 | CA | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5.7 | 5.1 | - |
| 氣甲基安非他命 | CMA | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5.7 | 5.1 | - |
| 安得力多靜脈注射液 | Etomidate-Lipuro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 氟甲基卡西酮 | Fluoromethcathinone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 氣甲基安非他命 | FMA | 1 | 40 | 0 | 6 | 24 | 5 | 15 | 42.9 | 38.5 | 150.0 |
| 類大麻活性物質 | K2、Spice | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 28.6 | 25.6 | - |
| 浴鹽 | MDPV | 47 | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5.7 | 5.1 | 0.0 |
| 喵喵 | Mephedrone | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.7 | 5.1 | 100.0 |
| BZP | N-Benzylpiperazine | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 牛奶針 | Propofol | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.9 | 2.6 | - |
| 瑞吩坦尼 | Remifentanil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 他噴他寶 | Tapentadol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 三氟甲苯哌嗪 | TFMPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | - |
| 大象針 | Thiamylal | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.9 | 2.6 | - |
| 總計 | Sum(c) | 54 | 78 | 0 | 9 | 47 | 12 | 39 | - | - | 333.3 |
| 通報個案數(件) | Number of case(b) | 53 | 72 | 0 | 8 | 42 | 10 | 35 | - | - | 337.5 |

註1：資料自103年1月1日起開始蒐集。

註2：同一個案可能濫用一種或一種以上之藥物。

註3：“-”係指去年同期累計為0，故不予比較同期增減百分比。


註4：占通報個案數(件)百分比係指“人次/個案數(a/b*100)。

註5：占藥物濫用總人次百分比係指“人次/人次”(a/c*100)。

註6：自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所計算。

註7：自104年11月起，新增安得力多靜脈注射液及牛奶針2品項獨立統計。

圖二



台灣地區醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類統計圖

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：106/09/01

| 種類 (a) | 年度 | | | | | | | | | | | | | | 較去年1-5月增 減百分比(%) 【(d-c)/c*100】 |
|---------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-------------|------|-------------|---------------------------------|--------|--------------------------------------|
| | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | 106年 | | | | |
| | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 5月 | 1-5月 (c) | 5月 | 1-5月 (d) | 1-5月合計 百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| Alprazolam | 42 | 38 | 32 | 41 | 34 | 12 | 14 | 16 | 4 | 6 | 1 | 10 | 3.1 | 66.7 | |
| Bromazepam | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.9 | 200.0 | |
| Brotizolam | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 32 | 9.8 | - | |
| Camazepam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| Chlordiazepoxide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| Clobazam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| Clonazepam | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1.8 | 100.0 | |
| Clorazepate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| Clotiazepam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| Cloxazolam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| Delorazepam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| Diazepam | 61 | 30 | 25 | 25 | 11 | 159 | 8 | 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1.8 | 50.0 | |
| Estazolam | 14 | 33 | 3 | 11 | 11 | 10 | 15 | 20 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1.8 | -33.3 | |
| Ethyl loflazepate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| Fludiazepam | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | - | |
| Flunitrazepam (FM2) | 273 | 254 | 263 | 324 | 352 | 434 | 500 | 521 | 58 | 281 | 58 | 253 | 77.6 | -10.0 | |
| Flurazepam | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| Halazepam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | - | |
| Haloxazolam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| Ketazolam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | -100.0 | |
| Loprazolam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |

表四

台灣地區醫療院所通報藥物濫用者使用Benzodiazepines類藥物分布統計表

單位：人次，製表日期：106/09/01

| 種類 (a) | 年度 | | | | | | | | | | | | | | 較去年1-5月增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|
| | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | 106年 | | | | |
| | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 5月 | 1-5月(c) | 5月 | 1-5月(d) | 1-5月合計百分比(%) 【(d/b)*100】 | | |
| Lorazepam | 12 | 30 | 10 | 14 | 13 | 17 | 19 | 14 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1.8 | -14.3 | |
| Lormetazepam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| Medazepam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| Midazolam | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.0 | |
| Nimetazepam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| Nitrazepam | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | - | |
| Nordiazepam | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| Oxazepam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | -100.0 | |
| Oxazolam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | -100.0 | |
| Pinazepam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| Prazepam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| Temazepam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| Tetrazepam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | |
| Triazolam | 4 | 16 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | -100.0 | |
| 未明品項之BZD藥物 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | -100.0 | |
| 總計 (b) | 442 | 421 | 345 | 428 | 443 | 642 | 567 | 611 | 67 | 319 | 70 | 326 | 100 | 2.2 | |

資料來源：衛生福利部食品藥物管理署

註1：“-”係指因個案數太少，故不予比較同期增減百分比。

註2：自91年7月起，“藥物種類”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註3：自92年5月起，因考量各醫療院補通報個案因素，歷年初步統計數據已作調整，另監所受戒治人資料不列入。自104年2月起，原「毒藥物諮詢中心」之通報資料併入醫療院所

註4：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註5：103年1月起新增Camazepam、Clotiazepam、Cloxazolam、Delorazepam、Ethyl loflazepate、Halazepam、Haloxazolam、Ketazolam、Medazepam、Pinazepam、Temazepam、

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

| 毒品等級 | 項目(a) | | 年份 | | | | | | | | | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-4月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】 |
|------------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
| | 中文品名 | | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 合計 | 4月 | 1-4月 (c) | 1-12月 | 4月 | 1-4月 (d) | |
| 第一級 | 古柯鹼 | Cocaine | 1,342.0 | 64,406.5 | 68.5 | 1,452.7 | 0.0 | 1,689.7 | 0.0 | 0.0 | 69.9 | 14.7 | 1,136.4 | 7,525.6 | 177,523.1 | 177,560.3 | 15.4 | 15,524.8 |
| | 二氫去氧嗎啡 | Desomorphine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 愛托啡因 | Etorphine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 海洛因 | Heroin | 137,669.0 | 130,516.7 | 62,420.3 | 83,607.2 | 17,836.0 | 157,941.0 | 288,257.0 | 86737.5 | 55,716.8 | 286.6 | 4,965.2 | 57,691.0 | 1696.2 | 5,472.3 | 0.5 | 10.2 |
| | 酚派丙酮 | Ketobemidone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 嗎啡 | Morphine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 13.7 | 0.9 | 292.6 | 3.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 鴉片 | Opium | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 其他 | Others | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 第二級 | 乙醯二氫可待因 | Acetyldihydrocodeine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 乙醯美沙多 | Acetylmethadol | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 貝他羥基吩坦尼 | Betahydroxyfentanyl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 大麻 | Cannabis | 22,314.5 | 13,208.6 | 61,066.8 | 21,009.6 | 1,589.0 | 14,351.6 | 35,745.3 | 10726.1 | 39,933.6 | 5764.7 | 10,617.9 | 40,712.9 | 8567.4 | 59,087.9 | 5.1 | 456.5 |
| | 卡吩坦尼 | Carfentanyl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 古柯 | Coca | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 可待因 (≥5.0gm/100ml or 100gm) | Codeine (≥5.0gm/100ml or 100gm) | 0.0 | 2.6 | 362.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | N-氧化可待因 | Codeine-N-oxide | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 二氫可待因 (≥5.0gm/100ml or 100gm) | Dihydrocodeine (≥5.0gm/100ml or 100gm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 二氫嗎啡 | Dihydromorphine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 狄門諾沙多 | Dimenoxadol | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 乙基嗎啡 | Ethylmorphine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 伽碼羥基丁酸 | Gammahydroxybutyric Acid (GHB) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 369.4 | 27.5 | 100.1 | 200.2 | 200.2 | 200.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
| | 麥角二乙胺 | LSD、Lysergide | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 美沙冬 | Methadone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
| | 安非他命 | Amphetamine | 124,334.5 | 28,371.9 | 107,023.2 | 251,864.0 | 140,603.7 | 119,301.4 | 775,849.9 | 462924.7 | 506,463.3 | 129,939.6 | 150,983.4 | 229,147.9 | 3200.5 | 16,188.8 | 1.4 | -89.3 |
| | 甲基安非他命 | Methylamphetamine | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 192,052.9 | 308,399.9 | 26.7 | — |
| | 安非他命半成品及原料 | Semimanufactures of (Meth)Amphetamine | 95,452.7 | 324.0 | 0.0 | 3,450.7 | 0.0 | 0.0 | 54.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 甲喹酮(俗稱：白板) | Methaqualone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 甲基去氧嗎啡 | Methyldesorphine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 甲基二氫嗎啡 | Methyldihydromorphine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 亞甲雙氧甲基安非他命 (俗稱：搖頭丸) | 3,4-methylenedioxy- methamphetamine [MDMA] | 17,902.0 | 896.1 | 2,017.3 | 5,882.4 | 23,947.9 | 5,751.3 | 20,379.5 | 2274.9 | 1,003.0 | 360.6 | 412.1 | 1,115.7 | 1.1 | 31.6 | 0.0 | -92.3 | |

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

| 毒品等級 | 項目(a) | | 年份 | | | | | | | | | | 105年 | | | | | 106年 | | | 較去年1-4月 增減百分比(%) 【(d-c)/e*100】 |
|------|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------------|-----------|-----|-------------|---------------------------------|--------|--|--|--------------------------------------|
| | 中文品名 | | 96年 合計 | 97年 合計 | 98年 合計 | 99年 合計 | 100年 合計 | 101年 合計 | 102年 合計 | 103年 合計 | 104年 合計 | 4月 | 1-4月 (c) | 1-12月 | 4月 | 1-4月 (d) | 1-4月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】 | | | | |
| | 5-甲氧基-3,4-亞甲基雙氫安非他命 | 5-Methoxy-3,4-methylenedioxyamphetamine [MMDA] | — | 0.0 | 8,697.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.4 | 94.8 | 95.3 | 107.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | | | |
| | 三甲基吩坦尼 | 3-Methylfentanyl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | | | |
| | 三甲基硫吩坦尼 | 3-Methylthio-fentanyl | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | | | |
| | 4-甲氧基安非他命 | PMA | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 96.4 | 147.8 | 149.7 | 825.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | | | |
| | 甲基磺胺嗎啡 | Morphine methylsulfonate | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | | | |
| | N-氧化嗎啡及其衍生物 | Morphine-N-oxide and its Derivatives | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | | | |
| | 嗎啡甲溴化物 | Morphine methobromide | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | | | |
| | 甲氧基甲基卡西酮 | Methoxymethcathinone | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 3,240.8 | 5,798.5 | 5,798.5 | 5,798.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | | | |
| | 甲基卡西酮 | Methcathinone | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 217.8 | 0.6 | 41.3 | 41.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | | | |
| | 菸鹼醯可待因 | Nicocodine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | | | |
| | 菸鹼醯嗎啡 | Nicomorphine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | | | |
| | 原可待因 | Norcodeine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | | | |
| | N-羥基-3,4-亞甲基雙氫安非他命 | N-hydroxy-MDA | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 145.6 | 261.2 | 261.2 | 264.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | | | |
| | N,N-二甲基安非他命 | N,N-Dimethylamphetamine | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | | | |
| | 罌粟 | Opium Poppy | 2,279.9 | 5,748.8 | 0.0 | 1.6 | 187.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | | | |
| | 潘他唑新(俗稱:達賜康) | Pentazocine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | | | |
| | 配西汀 | Pethidine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | | | |
| | 蘇芬坦尼 | Sufentanil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | | | |
| | 亞甲基二氧吡咯戊酮(俗稱:浴鹽) | Methylenedioxypropylone (MDPV) | — | — | — | — | — | 2,807.8 | 13.7 | 388.4 | 776.8 | 776.8 | 776.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | | | |
| | 卡西酮 | Benzoylthamphetamine (Cathinone) | — | — | — | — | — | 2,951.6 | 4008.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | | | |
| | 四氫大麻酚 | (Tetrahydrocannabinols · THC) | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 5.1 | 11.8 | 13.4 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | | | |
| | 其他 | Others | 31.9 | 44.8 | 63.6 | 13.4 | 604.3 | 4,423.4 | 65.6 | 902.1 | 175.5 | 43,222.9 | 67,508.1 | 388,528.6 | 0.3 | 1,798.3 | 0.2 | -97.3 | | | |
| | 伯替唑他 | Brotizolam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | | | |
| | 丁基原啡因 | Buprenorphine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | | | |
| | 卡西酮 | Cathine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | | | |
| | 可待因 (≥1<5gm/100ml or 100gm) | Codeine(≥1<5gm/100ml or 100gm) | 16.8 | 0.0 | 124.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 | 0.0 | 68.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | | | |

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

| 毒品等級 | 項目(a) 中文品名 | 年份 | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-4月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】 | | |
|------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------|---|
| | | | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 4月 | 1-4月 (c) | 1-12月 | 4月 | 1-4月 (d) | 1-4月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】 | | | |
| 第三級 | 二氫可待因 (≥1<5gm/100ml or 100gm) | Dihydrocodeine (≥1<5gm/100ml or 100gm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| | 氟硝西洋 | Flunitrazepam [FM2] | 2.0 | 44.3 | 0.4 | 23.8 | 16.3 | 6.0 | 63.3 | 8.5 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 0.0 | 20.1 | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 愷他命 | Ketamine | 598,678.5 | 799,495.5 | 1,186,363.6 | 2,594,282.1 | 1,371,850.9 | 2,111,113.3 | 2,393,266.5 | 3303193.5 | 1,768,395.0 | 17,635.1 | 370,104.2 | 1,201,970.9 | 750.8 | 131,954.5 | 11.4 | -64.3 | | |
| | 西可巴比妥(俗稱:紅中) | Secobarbital | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 三唑他(俗稱:小白板) | Triazolam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 硝甲西洋(一粒眠) | Nimetazepam | 205,699.0 | 1,157.7 | 15,262.3 | 24,106.7 | 11,964.8 | 116,044.7 | 10,703.1 | 879.2 | 3,835.7 | 106.3 | 651.5 | 2,229.6 | 80.5 | 9,692.3 | 0.8 | 1,387.7 | | |
| | 對-甲氧基甲基安非他命 | Para-methoxymethamphetamine(PMMA) | — | 0.0 | 30.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 960.1 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 對-氯安非他命 | Para-Chloroamphetamine(PCA) | — | — | — | 0.0 | 50,496.7 | — | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 芬納西洋 | Phenazepam | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 3038.8 | 1,809.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 3,4-亞甲基雙氧氣甲基卡西酮 | 3,4-methylenedioxyamphetaminone(Methylone · bk-MDMA) | — | — | — | — | — | — | 16,391.1 | 1353.0 | 1,995.4 | 14.2 | 76.3 | 167.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | |
| | 4-甲基甲基卡西酮 | Mephedrone(4-MMC) | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 2108.7 | 143.9 | 0.0 | 62.7 | 477.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | |
| | 1-(5-氟戊基)-3-(1-四甲基環丙基甲鹽)吡啶 | XLR-11 | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 29289.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | |
| 其他 | Others | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 122.4 | 1,621.9 | 6,336.4 | 1,374.0 | 1483.6 | 648.9 | 125.9 | 4,131.2 | 14,092.9 | 159.1 | 1,296.0 | 0.1 | -68.6 | | | |
| 第四級 | 阿普唑他(三氫二氫平) | Alprazolam | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 14.4 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 可待因(<1gm/100ml) | Codeine (<1gm/100ml) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 安定 | Diazepam(Valium®) | 372.2 | 0.0 | 62.9 | 428.2 | 5.6 | 0.0 | 14.6 | 66.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 二氫可待因(<1gm/100ml) | Dihydrocodeine (<1gm/100ml) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 麻黃鹼(原料藥) | Ephedrine | 412,366.8 | 66,387.3 | 77,651.8 | 136,388.9 | 87,293.2 | 7,479.4 | 101,881.9 | 212874.8 | 1,317,948.7 | 133.8 | 49,039.3 | 234,542.8 | 19,014.9 | 29,865.6 | 2.6 | -39.1 | | |
| | 鹽酸羥亞胺 | Hydroxylamine · HCl | 0.0 | 289,200.4 | 305,840.0 | 123,234.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 勞拉西洋 | Lorazepam | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 甲基麻黃鹼(原料藥) | Methylephedrine | 492.3 | 975.8 | 1,554.9 | 1,956.7 | 4,916.1 | 5,220.9 | 591.1 | 2452.0 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 硝西洋 | Nitrazepam | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 832.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 去甲西洋 | Nordiazepam | — | 0.0 | 73.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 甲基苯乙基胺(二甲苯乙胺) | Phentermine | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 去甲麻黃鹼(原料藥) | Phenylpropanolamine | — | 0.0 | 1,004.5 | 0.0 | 291,471.5 | 36,616.0 | 0.0 | 588.6 | 256.4 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | |
| | 假麻黃鹼(原料藥) | Pseudoephedrine | 7,471.9 | 489,574.4 | 70,798.3 | 240,062.9 | 329,256.4 | 35,636.4 | 4,272.0 | 13005.3 | 448,991.2 | 0.0 | 1.6 | 17.7 | 2,820.8 | 24,475.6 | 2.1 | 1,529,622.5 | | |
| | 氯假麻黃鹼(先驅原料) | Chlorpseudoephedrine | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 350,219.7 | 30.3 | — | | |
| 氯麻黃鹼(先驅原料) | Chloroephedrine | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 40,255.1 | 3.5 | — | | | |

表五

緝獲毒品統計表

單位：公克

| 毒品等級 | 項目(a) | | 年份 | | | | | | | | | 105年 | | 106年 | | | 較去年1-4月 增減百分比(%) 【(d-c)/c*100】 | | |
|------|----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| | 中文品名 | | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 合計 | 4月 | 1-4月 (c) | 1-12月 | 4月 | | 1-4月 (d) | 1-4月小計 百分比(%) 【(d/b)*100】 |
| | 替馬西洋 | Temazepam | — | 0.0 | 10.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| | 特拉嗎竇 | Tramadol | 8,258.1 | 0.0 | 42.5 | 0.0 | 2,307.7 | 46.6 | 177.6 | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| | 佐沛眠 | Zolpidem | 0.0 | 0.0 | 19.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| | 鄰-氯苯基環戊基酮 | o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2- Chlorophenylcyclopentyl ketone、o- Chlorobenzoylcyclopenta ne | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 20724.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| | 札來普隆 | Zaleplon | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 17,271.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| | 苯基丙酮(原料藥) | (Phenyl-2-propanone、 P2P) | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 173,179.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| | 2-苯基乙醯基乙腈(原料藥) | (alpha- Acetylphenylacetonitrile 、APAAN) | — | — | — | — | — | — | — | 0.0 | 497,207.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| | 其他 | Others | 11.8 | 0.0 | 159.1 | 42.6 | 4,118.2 | 387.6 | 944.7 | 1792.4 | 28.1 | 40,006.5 | 887,152.6 | 4,417,935.8 | 21.9 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
| | 總計(b) | | 1,634,695.9 | 1,890,354.9 | 1,900,735.2 | 3,487,946.3 | 2,340,101.6 | 2,622,449.2 | 3,656,481.0 | 4160704.5 | 4,841,165.5 | 244,921.2 | 1,554,197.4 | 6,604,248.5 | 405,889.4 | 1,156,359.1 | 100.0 | 0.0 | -25.6 |
| 其他 | 種子(罌粟、古柯、大麻) | Seeds (Opium Poppy, Coca, Cannabis etc.) | 365.0 | 0.0 | 6.2 | 6.1 | 187.9 | 6.3 | 74.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| | 減肥藥等 | Weight-loss Drugs | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |
| | 其他 | Others | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 515.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — |

資料來源：法務部統計處、法務部調查局、內政部警政署、國防部憲兵指揮部、財政部關務署、行政院海岸巡防署。

註1：本表數據係依緝獲當時之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

註2：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

註3：“項目”依英文字母A至Z排序，方便查閱。

註4：自101年1月起，將麻黃鹼類原料藥，包括麻黃鹼、甲基麻黃鹼、假麻黃鹼及去甲基麻黃鹼四個品項分別表列。

註5：為與國際間之統計方式一致，自95年1月起，毒品重量改按當期鑑定之純質淨重計算；其中第一級毒品鴉片，第二級毒品罌粟、古柯及大麻等非合成毒品則以淨重統計。

註6：自95年8月8日起，依毒品危害防制條例修正確甲西洋由原第四級毒品改列為第三級毒品。

註7：自96年5月11日起，依毒品危害防制條例修正特拉嗎竇由原第三級毒品改列為第四級毒品。

註8：自102年12月起新增浴鹽及卡西酮2品項獨立統計。

註9：自104年8月起新增四氫大麻酚、苯基丙酮及2-苯基乙醯基乙腈3品項獨立統計。

註10：105年1月起法務部統計處將安非他命及甲基安非他命分開計算。

註11：自106年2月起新增甲基安非他命、氣假麻黃鹼、氣麻黃鹼3品項獨立統計。

表六

學生藥物濫用品項分級統計表

單位：人數

| 年度 藥物品項(c) | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | 較去年1-4月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100] | |
|-----------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------|-------|------|---------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | | | 4月 | 1-4月(a) | 1-12月 | 4月 | 1-4月(b) | | 1-4月小計百 分比(%) 【(b/d)*100】 |
| 一級毒品 (海洛因、嗎啡) | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.0 |
| 二級毒品 (安非他命、搖頭丸、大麻) | 55 | 107 | 151 | 282 | 257 | 241 | 201 | 241 | 263 | 30 | 82 | 82 | 28 | 114 | 38.5 | 39.0 |
| 三級毒品 (愷他命、FM2、一粒眠) | 235 | 702 | 1,148 | 1,271 | 1,548 | 2,188 | 1,819 | 1,453 | 1,485 | 81 | 212 | 212 | 30 | 124 | 41.9 | -41.5 |
| 四級毒品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| 其他 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.0 | 200.0 |
| 合計(d) | 294 | 815 | 1,308 | 1,559 | 1,810 | 2,432 | 2,021 | 1,700 | 1,749 | 111 | 296 | 296 | 59 | 242 | 100.0 | -18.2 |

資料來源：教育部。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表七

學生藥物濫用各學制統計表

單位：人數

| 學制別(c) | 96年 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-4月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100] |
|--------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------------|-------|------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | | 4月 | 1-4月 (a) | 1-12月 | 4月 | 1-4月 (b) | 1-4月小計百分 比(%) 【(b/d)*100】 | |
| 國小 | 4 | 14 | 6 | 12 | 3 | 8 | 10 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.4 | -75.0 |
| 國中 | 164 | 204 | 392 | 435 | 598 | 855 | 641 | 582 | 600 | 61 | 154 | 361 | 21 | 106 | 43.8 | -31.2 |
| 高中職 | 116 | 585 | 902 | 1,099 | 1,174 | 1,503 | 1,257 | 1,031 | 1,029 | 46 | 122 | 581 | 32 | 115 | 47.5 | -5.7 |
| 大專校院 | 10 | 12 | 8 | 13 | 35 | 66 | 113 | 79 | 113 | 3 | 16 | 59 | 6 | 20 | 8.3 | 25.0 |
| 合計(d) | 294 | 815 | 1,308 | 1,559 | 1,810 | 2,432 | 2,021 | 1,700 | 1,749 | 111 | 296 | 1,006 | 59 | 242 | 100.0 | -18.2 |

資料來源：教育部。

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：106/09/01

| 身 分 別 | 項目別 | | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | 106年 | | 較去年1-5月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100] | | |
|--------------------------------------|--------|----------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|--------------------------------------|------|-------|
| | | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(a) | 5月 | 1-5月(b) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新 入 所 受 觀 察 勒 戒 | 總計 | | 10,311 | 8,305 | 9,501 | 8,565 | 6,969 | 6,700 | 5,978 | 6,715 | 660 | 2,921 | 564 | 2,860 | -2.1 | | |
| | 性 別 | 男 | 實數 | 8,617 | 6,847 | 7,753 | 7,107 | 5,728 | 5,531 | 5,045 | 5,736 | 565 | 2,511 | 478 | 2,428 | -3.3 | |
| | | | 百分比(%) | 83.6 | 82.4 | 81.6 | 83.0 | 82.2 | 82.6 | 84.4 | 85.4 | 85.6 | 86.0 | 84.8 | 84.9 | — | |
| | | 女 | 實數 | 1,694 | 1,458 | 1,748 | 1,458 | 1,241 | 1,169 | 933 | 979 | 979 | 95 | 410 | 86 | 432 | 5.4 |
| | | | 百分比(%) | 16.4 | 17.6 | 18.4 | 17.0 | 17.8 | 17.4 | 15.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.0 | 15.2 | 15.1 | — |
| | 年 齡 | 18歲未滿 | 實數 | 242 | 157 | 171 | 134 | 112 | 83 | 86 | 57 | 3 | 15 | 3 | 17 | 13.3 | |
| | | | 百分比(%) | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | — |
| | | 18-24歲未滿 | 實數 | 1,432 | 1,258 | 1,811 | 1,726 | 1,359 | 1,289 | 1,259 | 1,413 | 1,413 | 130 | 589 | 94 | 547 | -7.1 |
| | | | 百分比(%) | 13.9 | 15.1 | 19.1 | 20.2 | 19.5 | 19.2 | 21.1 | 21.0 | 21.0 | 19.7 | 20.2 | 16.7 | 19.1 | — |
| | | 24-30歲未滿 | 實數 | 2,713 | 2,137 | 2,374 | 1,974 | 1,532 | 1,504 | 1,124 | 1,310 | 1,310 | 137 | 609 | 116 | 541 | -11.2 |
| | | | 百分比(%) | 26.3 | 25.7 | 25.0 | 23.0 | 22.0 | 22.4 | 18.8 | 19.5 | 19.5 | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 18.9 | — |
| | | 30-40歲未滿 | 實數 | 3,667 | 2,934 | 3,337 | 3,006 | 2,541 | 2,432 | 2,160 | 2,381 | 2,381 | 219 | 1,010 | 201 | 966 | -4.4 |
| | | | 百分比(%) | 35.6 | 35.3 | 35.1 | 35.1 | 36.5 | 36.3 | 36.1 | 35.5 | 35.5 | 33.2 | 34.6 | 35.6 | 33.8 | — |
| | | 40-50歲未滿 | 實數 | 1,734 | 1,340 | 1,331 | 1,251 | 1,059 | 1,035 | 982 | 1,122 | 1,122 | 124 | 510 | 111 | 562 | 10.2 |
| | | | 百分比(%) | 16.8 | 16.1 | 14.0 | 14.6 | 15.2 | 15.4 | 16.4 | 16.7 | 16.7 | 18.8 | 17.5 | 19.7 | 19.7 | — |
| | | 50歲以上 | 實數 | 523 | 479 | 477 | 474 | 366 | 357 | 367 | 432 | 432 | 47 | 188 | 39 | 227 | 20.7 |
| | | | 百分比(%) | 5.1 | 5.8 | 5.0 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 7.1 | 6.4 | 6.9 | 7.9 | — |

表八

新入所觀察勒戒及受戒治人統計表

單位：人，製表日期：106/09/01

| 身 分 別 | 項目別 | | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | 106年 | | 較去年1-5月增 減百分比(%) [(b-a)/a*100] | | |
|---------------------------------|--------|----------|--------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|---------|------|---------|--------------------------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(a) | 5月 | 1-5月(b) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新 入 所 受 戒 治 人 | 總計 | | 3,396 | 1,972 | 1,470 | 1,094 | 793 | 664 | 609 | 623 | 54 | 251 | 56 | 267 | 6.4 | | |
| | 性 別 | 男 | 實數 | 2,989 | 1,720 | 1,296 | 982 | 672 | 591 | 539 | 533 | 44 | 221 | 47 | 226 | 2.3 | |
| | | | 百分比(%) | 88.0 | 87.2 | 88.2 | 89.8 | 84.7 | 89.0 | 88.5 | 85.6 | 81.5 | 88.0 | 83.9 | 84.6 | — | |
| | | 女 | 實數 | 407 | 252 | 174 | 112 | 121 | 73 | 70 | 90 | 90 | 10 | 30 | 9 | 41 | 36.7 |
| | | | 百分比(%) | 12.0 | 12.8 | 11.8 | 10.2 | 15.3 | 11.0 | 11.5 | 14.4 | 18.5 | 12.0 | 16.1 | 15.4 | — | |
| | 年 齡 | 18歲未滿 | 實數 | 4 | 17 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -50.0 | |
| | | | 百分比(%) | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.7 | — | |
| | | 18-24歲未滿 | 實數 | 85 | 48 | 29 | 26 | 22 | 26 | 15 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 5 | 25.0 |
| | | | 百分比(%) | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.9 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.9 | — | |
| | | 24-30歲未滿 | 實數 | 471 | 218 | 143 | 59 | 44 | 37 | 27 | 19 | 19 | 0 | 8 | 2 | 13 | 62.5 |
| | | | 百分比(%) | 13.9 | 11.1 | 9.7 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 4.4 | 3.0 | 0.0 | 3.2 | 3.6 | 4.9 | — | |
| | | 30-40歲未滿 | 實數 | 1,437 | 763 | 535 | 371 | 248 | 184 | 179 | 157 | 157 | 14 | 72 | 18 | 57 | -20.8 |
| | | | 百分比(%) | 42.3 | 38.7 | 36.4 | 33.9 | 31.3 | 27.7 | 29.4 | 25.2 | 25.9 | 28.7 | 32.1 | 21.3 | — | |
| | | 40-50歲未滿 | 實數 | 1,028 | 664 | 528 | 409 | 314 | 261 | 257 | 290 | 290 | 21 | 106 | 23 | 115 | 8.5 |
| | | | 百分比(%) | 30.3 | 33.7 | 35.9 | 37.4 | 39.6 | 39.3 | 42.2 | 46.5 | 38.9 | 42.2 | 41.1 | 43.1 | — | |
| | | 50歲以上 | 實數 | 371 | 262 | 226 | 223 | 160 | 148 | 123 | 145 | 145 | 19 | 57 | 13 | 75 | 31.6 |
| | | | 百分比(%) | 10.9 | 13.3 | 15.4 | 20.4 | 20.2 | 22.3 | 20.2 | 23.3 | 35.2 | 22.7 | 23.2 | 28.1 | — | |

資料來源：法務部統計處。

註：“—”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表九

執行毒品案件裁判確定有罪人數及毒品新入監受刑人數統計表

單位：人，製表日期：106/09/01

| 毒品分級(c) | 年度 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | 106年 | | 較去年1-5月增減百分比(%) [(b-a)/a*100] | | |
|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|---------|----------------------------------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(a) | 5月 | 1-5月(b) | | 1-5月小計百分比(%) 【(c/d)*100】 | |
| 裁判確定有罪人數 | 合計(d) | 41,120 | 36,758 | 35,460 | 36,440 | 36,410 | 36,096 | 34,672 | 35,960 | 3,289 | 16,440 | 3,827 | 18,489 | - | 12.5 | |
| | 一級 | 28,286 | 24,624 | 18,271 | 16,614 | 15,753 | 13,592 | 11,038 | 10,907 | 975 | 4,852 | 1,094 | 5,310 | 28.7 | 9.4 | |
| | 二級 | 12,401 | 11,504 | 15,999 | 18,007 | 18,558 | 19,796 | 21,203 | 23,043 | 2,153 | 10,686 | 2,613 | 12,546 | 67.9 | 17.4 | |
| | 三級 | 398 | 591 | 1,139 | 1,747 | 2,023 | 2,629 | 2,388 | 1,973 | 160 | 891 | 118 | 625 | 3.4 | -29.9 | |
| | 四級 | 24 | 36 | 41 | 57 | 69 | 68 | 35 | 25 | 25 | 1 | 8 | 1 | 6 | 0.0 | -25.0 |
| | 其他 | 11 | 3 | 10 | 15 | 7 | 11 | 8 | 12 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.0 | -33.3 |
| 毒品新入監受刑人數 | 合計(d) | 14,492 | 12,440 | 11,247 | 11,474 | 10,971 | 10,434 | 9,681 | 9,739 | 1,040 | 4,226 | 1,092 | 4,645 | - | 9.9 | |
| | 一級毒品 | 10,267 | 8,685 | 6,291 | 5,544 | 5,083 | 4,775 | 3,913 | 3,759 | 401 | 1,558 | 383 | 1,627 | 35.0 | 4.4 | |
| | 二級毒品 | 3,841 | 3,395 | 4,410 | 5,205 | 5,023 | 4,789 | 4,868 | 5,117 | 557 | 2,340 | 650 | 2,752 | 59.2 | 17.6 | |
| | 三級毒品 | 232 | 272 | 438 | 580 | 655 | 696 | 717 | 659 | 57 | 236 | 32 | 176 | 3.8 | -25.4 | |
| | 四級毒品 | 15 | 14 | 16 | 23 | 39 | 24 | 23 | 15 | 15 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.1 | - |
| | 其他 | 137 | 74 | 92 | 122 | 171 | 150 | 160 | 189 | 189 | 23 | 88 | 26 | 87 | 1.9 | -1.1 |

資料來源：法務部統計處。

註：“-”係指因數值太少，故不予比較同期增減百分比。

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：106/09/04

| 查獲年度 | 98年度 | 99年度 | 100年度 | 101年度 | 102年度 | 103年度 | 104年度 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比(%) [(b-a)/a*100] | |
|-----------------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|-----------------------------|------|---------|-----------------------------|----------------------------------|---------|
| | | | | | | | | 5月 | 1-5月(a) | 1-5月合計百分比(%) 【(a/d)*100】 | 5月 | 1-5月(b) | 1-5月合計百分比(%) 【(b/d)*100】 | | |
| 查獲數合計(d) | 662 | 9,406 | 12,980 | 21,714 | 30,663 | 22,714 | 24,657 | 1,899 | 8,267 | - | 662 | 3,179 | - | -61.5 | |
| 年齡(c) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 持有第三級毒品淨重未達20公克 | 小計 | 68 | 411 | 581 | 712 | 942 | 884 | 1,241 | 117 | 555 | 6.7 | 143 | 738 | 23.2 | 33.0 |
| | 50歲以上 | 1 | 5 | 6 | 12 | 13 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 11 | 0.3 | 1,000.0 |
| | 40歲以上50歲未滿 | 1 | 20 | 22 | 46 | 60 | 74 | 73 | 14 | 38 | 0.5 | 7 | 32 | 1.0 | -15.8 |
| | 30歲以上40歲未滿 | 14 | 83 | 146 | 186 | 271 | 261 | 331 | 33 | 139 | 1.7 | 36 | 195 | 6.1 | 40.3 |
| | 24歲以上30歲未滿 | 32 | 152 | 200 | 212 | 284 | 227 | 351 | 28 | 165 | 2.0 | 42 | 249 | 7.8 | 50.9 |
| | 18歲以上24歲未滿 | 20 | 151 | 207 | 256 | 314 | 310 | 470 | 42 | 212 | 2.6 | 57 | 251 | 7.9 | 18.4 |
| 持有第四級毒品淨重未達20公克 | 小計 | 0 | 16 | 32 | 24 | 24 | 9 | 10 | 2 | 6 | 0.1 | 0 | 4 | 0.1 | -33.3 |
| | 50歲以上 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -100.0 |
| | 40歲以上50歲未滿 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.1 | 100.0 |
| | 30歲以上40歲未滿 | 0 | 2 | 10 | 7 | 11 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -100.0 |
| | 24歲以上30歲未滿 | 0 | 6 | 10 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | - |
| | 18歲以上24歲未滿 | 0 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | - |

表十

警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品未滿20公克構成行政罰案件

單位：人次，製表日期：106/09/04

| 查獲年度 | 98年度 | 99年度 | 100年度 | 101年度 | 102年度 | 103年度 | 104年度 | 105年 | | | 106年 | | | 較去年1-5月增減百分比(%) [(b-a)/a*100] | |
|---------------------------|------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|-----------------------------|------|---------|-----------------------------|----------------------------------|-------|
| | | | | | | | | 5月 | 1-5月(a) | 1-5月合計百分比(%) 【(a/d)*100】 | 5月 | 1-5月(b) | 1-5月合計百分比(%) 【(b/d)*100】 | | |
| 施用第三級毒品 | 小計 | 8,041 | 10,938 | 17,702 | 26,313 | 19,751 | 20,897 | 1,684 | 7,235 | 87.5 | 464 | 2,169 | 68.2 | -70.0 | |
| | 50歲以上 | 1 | 18 | 13 | 48 | 56 | 56 | 85 | 5 | 18 | 0.2 | 4 | 14 | 0.4 | -22.2 |
| | 40歲以上50歲未滿 | 6 | 127 | 162 | 300 | 541 | 400 | 437 | 32 | 167 | 2.0 | 12 | 49 | 1.5 | -70.7 |
| | 30歲以上40歲未滿 | 74 | 1,145 | 1,647 | 2,840 | 4,843 | 3,787 | 4,148 | 367 | 1,576 | 19.1 | 90 | 450 | 14.2 | -71.4 |
| | 24歲以上30歲未滿 | 194 | 2,965 | 3,842 | 6,063 | 8,835 | 6,385 | 6,434 | 539 | 2,337 | 28.3 | 142 | 693 | 21.8 | -70.3 |
| | 18歲以上24歲未滿 | 229 | 3,786 | 5,274 | 8,451 | 12,038 | 9,123 | 9,793 | 741 | 3,137 | 37.9 | 216 | 963 | 30.3 | -69.3 |
| 施用第四級毒品 | 小計 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | — |
| | 50歲以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| | 40歲以上50歲未滿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| | 30歲以上40歲未滿 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| | 24歲以上30歲未滿 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | — |
| | 18歲以上24歲未滿 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | — |
| 18歲未滿施用或持有20公克以下第三級毒品(人次) | 88 | 931 | 1,421 | 3,272 | 3,381 | 2,053 | 2,487 | 96 | 470 | 5.7 | 55 | 267 | 8.4 | -43.2 | |
| 18歲未滿施用或持有20公克以下第四級毒品(人次) | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 17 | 22 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -100.0 | |

資料來源：內政部警政署

註1：98年5月20日修正毒品危害防制條例，自98年11月20日起，針對無正當理由持有純質淨重20公克以上者，處以刑罰；未達20公克或施用第三級、第四級毒品者，處以行政裁罰。在此日期以前，持有、施用第三、四級毒品者，均無刑事責任及行政罰責。另98年度係為98年11月20日至98年12月31日間之統計數據。

註2：18歲未滿無法分類出施用或持有第三級、第四級毒品。

註3：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動。

表十一

查獲毒品案件數及嫌疑犯人數統計表

單位：人，製表日期：106/09/04

| 類別 | 單位 | 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | 102年 | 103年 | 104年 | 105年 | | 106年 | | 較去年1-5月 增減百分比(%) [(b-a)/a*100] | | |
|-------------|-----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------------------------------------|--------|-------|
| | | | | | | | | | | 5月 | 1-5月(a) | 5月 | 1-5月(b) | | | |
| 總數 毒品 | 查獲數 | 件 | 52,457 | 44,913 | 48,318 | 45,999 | 44,001 | 40,130 | 38,369 | 49,827 | 5,194 | 21,050 | 5,061 | 22,345 | 6.2 | |
| | 嫌疑犯 | 人 | 52,762 | 47,400 | 51,078 | 48,875 | 47,043 | 43,268 | 41,265 | 54,081 | 5,677 | 22,830 | 5,490 | 24,224 | 6.1 | |
| 一級毒品 | 查獲數 | 件 | 33,785 | 24,280 | 19,504 | 17,435 | 15,661 | 12,675 | 11,495 | 13,394 | 1,412 | 5,546 | 1,214 | 5,359 | -3.4 | |
| | | 百分比 | 64.4 | 54.1 | 40.4 | 37.9 | 35.6 | 31.6 | 30 | 26.9 | 27.2 | 26.3 | 24.0 | 24.0 | - | |
| | 嫌疑 犯人數 | 總數 | 人 | 33,378 | 25,092 | 20,238 | 18,361 | 16,488 | 13,320 | 12,129 | 14,570 | 1,543 | 6,065 | 1,336 | 5,844 | -3.6 |
| | | 少年 | 人 | 54 | 66 | 39 | 49 | 31 | 26 | 21 | 38 | 4 | 9 | 3 | 24 | 166.7 |
| | | 青年 | 人 | 1,238 | 825 | 619 | 472 | 349 | 278 | 222 | 351 | 26 | 103 | 16 | 78 | -24.3 |
| 成年 | | 人 | 32,086 | 24,201 | 19,580 | 17,840 | 16,108 | 13,016 | 11,886 | 14,181 | 1,513 | 5,953 | 1,317 | 5,742 | -3.5 | |
| 二級毒品 | 查獲數 | 件 | 18,019 | 19,713 | 27,694 | 26,968 | 26,021 | 24,687 | 24,625 | 33,577 | 3,629 | 14,822 | 3,735 | 16,357 | 10.4 | |
| | | 百分比 | 34.4 | 43.9 | 57.3 | 58.6 | 59.1 | 61.5 | 64 | 67.4 | 69.9 | 70.4 | 73.8 | 73.2 | - | |
| | 嫌疑 犯人數 | 總數 | 人 | 18,550 | 21,025 | 29,334 | 28,550 | 27,682 | 26,555 | 26,337 | 36,029 | 3,950 | 15,971 | 4,028 | 17,654 | 10.5 |
| | | 少年 | 人 | 416 | 534 | 862 | 819 | 798 | 679 | 727 | 1,140 | 74 | 276 | 99 | 369 | 33.7 |
| | | 青年 | 人 | 2,426 | 3,017 | 4,455 | 4,509 | 4,417 | 4,264 | 3,857 | 6,186 | 664 | 2,521 | 536 | 2,642 | 4.8 |
| 成年 | | 人 | 15,708 | 17,474 | 24,017 | 23,222 | 22,467 | 21,612 | 21,753 | 28,703 | 3,212 | 13,174 | 3,393 | 14,643 | 11.2 | |
| 三級毒品 | 查獲數 | 件 | 582 | 887 | 1,098 | 1,558 | 2,192 | 2,727 | 2,172 | 2,702 | 144 | 631 | 103 | 556 | -11.9 | |
| | | 百分比 | 1.1 | 2.0 | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 6.8 | 6 | 5.4 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | - | |
| | 嫌疑 犯人數 | 總數 | 人 | 766 | 1215 | 1467 | 1,916 | 2,716 | 3,317 | 2,710 | 3,315 | 174 | 743 | 114 | 652 | -12.2 |
| | | 少年 | 人 | 135 | 241 | 312 | 448 | 746 | 812 | 622 | 741 | 26 | 90 | 12 | 80 | -11.1 |
| | | 青年 | 人 | 299 | 504 | 563 | 804 | 1,126 | 1,424 | 1,184 | 1,499 | 62 | 341 | 52 | 304 | -10.9 |
| 成年 | | 人 | 332 | 470 | 592 | 664 | 844 | 1,081 | 904 | 1,075 | 86 | 312 | 50 | 268 | -14.1 | |
| 四級毒品 及其他 | 查獲數 | 件 | 71 | 33 | 22 | 38 | 127 | 41 | 77 | 154 | 9 | 51 | 9 | 73 | 43.1 | |
| | | 百分比 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | |
| | 嫌疑犯人數 | 人 | 68 | 68 | 39 | 48 | 157 | 76 | 89 | 167 | 10 | 51 | 12 | 74 | 45.1 | |

資料來源：內政部警政署

註1：少年係指12-17歲，青年係指18-23歲。

註2：本表數據係為當月之初步資料統計，定案後可能稍有變動，依據內政部警政署網站公告數據為主。